



(يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير القابلة للبرمجة)

التمرين الأول (3,5 ن)

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط $A(2, 0, -1)$ و $B(2, 4, 2)$ و $C(3, 3, 3)$ و الفلكة (S) التي معادلتها الديكارتيّة هي: $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 8z + 20 = 0$

- 1 (1) بين أن مركز الفلكة (S) هي النقطة $\Omega(2, 2, 4)$ و أن شعاعها يساوي 2 .
- 2 (0,75) ليكن (P) المستوى المار من النقطة A والعمودي على المستقيم (BC) .
بين أن معادلة ديكارتيّة للمستوى (P) هي: $x - y + z - 1 = 0$
- 3 (1) أ- بين أن المستوى (P) يقطع الفلكة (S) وفق دائرة (Γ) شعاعها يساوي 1.
ب- حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (Δ) المار من Ω و العمودي على (P) .
ج- حدد مثلث إحداثيات النقطة ω مركز الدائرة (Γ) .

التمرين الثاني (2,5 ن)

يحتوي كيس على ثلاث بیدقات بيضاء وأربع بیدقات سوداء (لا يمكن التمييز بين البیدقات باللمس).
نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث بیدقات من الكيس .

- 1 (0,75) ما هو احتمال الحصول على بیدقتين بالضبط لونهما أبيض؟
- 2 (0,75) ما هو احتمال الحصول على ثلاث بیدقات من نفس اللون؟
- 3 (1) ما هو احتمال الحصول على بیدقة بيضاء على الأقل؟

التمرين الثالث (3 ن)

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرفة بما يلي: $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{1}{5}(u_n - 4n - 1)$ لكل n من \mathbb{N} .

نضع $v_n = u_n + n - 1$ لكل n من \mathbb{N} .

1 (1) بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{5}$.

2 (0,5) أ- احسب v_n بدلالة n .

ب- استنتج u_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

3 (1) نضع $T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ حيث n عنصر من \mathbb{N} .

بين أن: $T_n = \frac{1}{4} \left(5 - \frac{1}{5^n} \right)$ و أن $S_n = T_n - \frac{(n+1)(n-2)}{2}$ لكل n من \mathbb{N} .

للتمرين الرابع (3 ن)

- (1) 0,25 تحقق من أن: $(\sqrt{2}+2i)^2 = -2+4\sqrt{2}i$.
- (2) 0,75 حل في مجموعة الأعداد العقدية C المعادلة: $z^2 - (\sqrt{2}+2)z + 2 + \sqrt{2} - \sqrt{2}i = 0$.
- (3) نعتبر العددين العقديين $z_1 = 1-i$ و $z_2 = 1+\sqrt{2}+i$.
- أ - حدد الشكل المثلثي للعدد العقدي z_1 . 0,5
- ب - بين أن: $z_1 \cdot z_2 = \sqrt{2} \bar{z}_2$ (\bar{z}_2 هو مرافق العدد z_2) . 1
- استنتج أن: $\arg(z_1) + 2\arg(z_2) \equiv 0 [2\pi]$.
- ج - حدد عمدة للعدد z_2 . 0,5

مسألة (8 ن)

- (I) لتكن g الدالة العددية المعرفة على $]0, +\infty[$ بما يلي: $g(x) = x - \frac{1}{x} - 2\ln x$.
- (1) 1 بين أن $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2}$ لكل x من $]0, +\infty[$ ثم استنتج منحنى تغيرات الدالة g على $]0, +\infty[$.
- (2) 0,5 بين أن $g(x) \leq 0$ لكل x من $]0, 1[$ و أن $g(x) \geq 0$ لكل x من $]1, +\infty[$ (لاحظ أن $g(1)=0$) .
- (II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0, +\infty[$ بما يلي: $f(x) = x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - 2$.
- ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}) .
- (1) 0,75 أ - بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ (يمكن وضع $t = \sqrt{x}$) ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- ب - تحقق من أن: $f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$ لكل x من $]0, +\infty[$. 0,25
- ج - احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (يمكن وضع $t = \frac{1}{x}$) ثم أول النتيجة هندسيا . 0,5
- د - بين أن (C) يقبل فرعاً شلجيميا اتجاهه المقارب هو المستقيم الذي معادلته هي: $y = x$. 0,5
- (2) 1,5 بين أن: $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$ لكل x من $]0, +\infty[$ ، ثم ضع جدول تغيرات الدالة f .
- (3) 1 أنشئ المنحنى (C) في المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) .
- (4) 0,5 أ - بين أن الدالة $G: x \rightarrow x \ln x - x$ دالة أصلية للدالة $g: x \rightarrow \ln x$ على $]0, +\infty[$.
- ب - باستعمال مكاملة بالأجزاء ، بين أن: $\int_1^e (\ln x)^2 dx = e - 2$. 0,75
- ج - حدد مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى (C) و محور الأفاصيل و المستقيمين اللذين معادلتهما: $x = e$ و $x = 1$. 0,75