

إذن  $k/1$  ونعلم أن قواسم 1 هي 1 و -1.

إذن  $k=1$  أو  $k=-1$

إذا كان  $k=1$  فإن  $k'=1$

إذا كان  $k=-1$  فإن  $k'=-1$

إذن  $\begin{cases} k=1 \\ k'=1 \end{cases}$  أو  $\begin{cases} k=-1 \\ k'=-1 \end{cases}$

إذن  $a=b$  أو  $a=-b$  إذن  $|a|=|b|$

### خاصية:

(\* العلاقة  $(/)$  انعكاسية. يعني  $(\forall a \in \mathbb{Z}) a/a$

(\* العلاقة  $(/)$  متعدية. يعني:  $(\forall (a,b,c) \in \mathbb{Z}^3) \begin{cases} a/b \\ b/c \end{cases} \Rightarrow a/c$

(\*  $(\forall (a,b) \in \mathbb{Z}^2) \begin{cases} a/b \\ b/a \end{cases} \Rightarrow |a|=|b|$

(\*  $(\forall (a,b) \in \mathbb{N}^2) \begin{cases} a/b \\ b/a \end{cases} \Rightarrow a=b$

نقول في هذه الحالة إن العلاقة  $(/)$  تخالفية.

### 3) القسمة الأقليدية في $\mathbb{Z}$

#### (a) القسمة الأقليدية في $\mathbb{N}$

### مبرهنة:

ليكن  $b \in \mathbb{N}^*$  و  $a \in \mathbb{N}$

يوجد زوج وحيد  $(q,r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  بحيث:  $\begin{cases} a = qb + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$

### برهان:

ليكن  $b \in \mathbb{N}^*$  و  $a \in \mathbb{N}$

### -1 Existence:

نعتبر المجموعة:  $A = \{k \in \mathbb{N} / kb \leq a\}$

\* لدينا  $0 \in A$  إذن  $A \neq \emptyset$

\* ليكن  $k \in A$  لدينا:  $kb \leq a$

ولدينا  $b \in \mathbb{N}^*$  يعني  $b \geq 1$  أي  $kb \geq k$

إذن  $k \leq a$

إذن  $(\forall k \in A) k \leq a$

إذن  $A$  مكبورة ب  $a$ .

\* ولدينا  $A \subset \mathbb{N}$ . إذن  $A$  تقبل الأكبر عنصر. نضع  $q = \text{Max}A$

و  $r = a - bq$

\* لنبين أن  $(q,r)$  يحقق الشرطين:

لدينا  $r = a - bq$  إذن  $a = b.q + r$

لنبين أن  $0 \leq r < b$

لدينا  $q = \text{Max}A$  إذن  $q \in A$  ومنه  $qb \leq a$

يعني  $a - qb \geq 0$

إذن  $0 \leq r$

لدينا  $q = \text{Max}A$  إذن  $(q+1) \notin A$

إذن  $(q+1)b > a$

يعني  $a < bq + b$

أي  $a - bq < b$  يعني  $r < b$

## I- قابلية القسمة في $\mathbb{Z}$

### (1) تعريف:

ليكن  $b \in \mathbb{Z}$  من  $\mathbb{Z}$ . نقول إن  $b$  يقسم  $a$  إذا وجد عدد  $k$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $a = kb$ . ونكتب  $b/a$ .

### ملاحظات:

\* إذا كان  $b/a$  نقول كذلك إن  $b$  قاسم ل  $a$  مضاعف ل  $b$ .

\* مجموعة مضاعفات  $b$  هي  $\{\dots, -2b, -b, 0, b, 2b, \dots\}$

يعني  $\{kb / k \in \mathbb{Z}\}$  ونرمز لها ب:  $b\mathbb{Z}$

\*  $1/a$   $(\forall a \in \mathbb{Z})$  (لأن  $a = 1.a$ )

\*  $-1/a$   $(\forall a \in \mathbb{Z})$  (لأن  $a = -1.(-a)$ )

\*  $a/0$   $(\forall a \in \mathbb{Z})$  (لأن  $0 = 0.a$ )

\*  $0/0$  (لأن مثلا  $0 = 0 \times 2$ )

\*  $0 \times a$   $(\forall a \in \mathbb{Z}^*)$

\* ليكن  $b/a$   $b \in \mathbb{Z}$  و  $a \in \mathbb{Z}^*$  بحيث

لدينا  $b/a$  إذن يوجد  $k \in \mathbb{Z}$  بحيث  $a = kb$

إذن:  $|a| = |k||b|$

ولدينا  $a \neq 0$  إذن  $k \neq 0$  إذن  $|k| \in \mathbb{N}^*$

يعني  $|k| \geq 1$

إذن  $|b||k| \geq |b|$

يعني  $|a| \geq |b|$

إذن:  $\begin{cases} a \neq 0 \\ b/a \end{cases} \Rightarrow |b| \leq |a|$

\*  $a/|a|$   $(\forall a \in \mathbb{Z})$

\*  $|a/a|$   $(\forall a \in \mathbb{Z})$

### (2) خاصيات قابلية القسمة:

1- ليكن  $a \in \mathbb{Z}$  لدينا:  $a = 1.a$  إذن  $a/a$

إذن  $a/a$   $(\forall a \in \mathbb{Z})$

نقول إن علاقة قابلية القسمة انعكاسية.

2- ليكن  $c$  و  $b$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $a/b$

لدينا  $a/b$  إذن يوجد  $k$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $b = ka$

ولدينا  $b/c$  إذن يوجد  $k'$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $c = k'b$

أي  $c = k'ka$

إذن  $a/c$

إذن  $(\forall (a,b,c) \in \mathbb{Z}^3) \begin{cases} a/b \\ b/c \end{cases} \Rightarrow a/c$

نقول إن العلاقة  $(/)$  متعدية.

3- ليكن  $b \in \mathbb{Z}$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $a/b$  و  $b/a$

لدينا  $a/b$  إذن يوجد  $k$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $b = ak$

و  $b/a$  إذن يوجد  $k'$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $a = bk'$

يعني  $a = kk'a$

\* إذ كان  $a = 0$  فإن  $b = 0$  إذن  $a = b$

\* إذا كان  $a \neq 0$  فإن  $kk' = 1$

إذن  $0 < r < b$

\* وبالتالي يوجد زوج  $(q, r)$  بحيث:  $\begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$

## L'unicité (2)

بنفس الطريقة السابقة نبين أن الزوج  $(q, r)$  وحيد.

## (II) الموافقة بتريديد n:

### (1) تعريف:

ليكن  $n \in \mathbb{N}$  و  $b \neq 0$  من  $\mathbb{Z}$   
نقول إن  $a$  يوافق  $b$  بتريديد  $n$  إذا وفقط إذا كان  
 $a \equiv b[n]$  ونكتب  $n/a - b$

### ملاحظة:

$$a \equiv b[n] \Leftrightarrow n/a - b$$

$$\Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}) a - b = nk$$

$$\Leftrightarrow a = nk + b$$

### (2) خاصيات:

1- ليكن  $n \in \mathbb{N}$

(\*  $(\forall a \in \mathbb{Z}) a \equiv a[n]$ )

إذن علاقة الموافقة انعكاسية.

(\* ليكن  $b \neq 0$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $a \equiv b[n]$ )

إذن  $n/a - b$  يعني يوجد  $k$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث:  $a - b = nk$

$$\text{إذن } b - a = n(-k)$$

إذن  $n/a - b$  ومنه  $b \equiv a[n]$

إذن  $a \equiv b[n] \Rightarrow b \equiv a[n]$  علاقة الموافقة تماثلية.

(\* ليكن  $b \neq 0$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث:  $\begin{cases} a \equiv b[n] \\ b \equiv c[n] \end{cases}$ )

لدينا  $a \equiv b[n]$  إذن (1)  $a - b = kn$  مع  $k$  من  $\mathbb{Z}$ .

و  $b \equiv c[n]$  إذن (2)  $b - c = k'n$  مع  $k' \in \mathbb{Z}$ .

من (1) + (2) نستنتج  $a - c = (k + k')n$  إذن  $n/a - c$  أي

$$a \equiv c[n]$$

$$\text{إذن: } \begin{cases} a \equiv b[n] \\ b \equiv c[n] \end{cases} \Rightarrow a \equiv c[n]$$

علاقة الموافقة متعدية.

### خاصية (1):

علاقة الموافقة انعكاسية تماثلية ومتعدية.

نقول إن علاقة الموافقة علاقة تكافؤ.

$$(\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3) * a \equiv a[n]$$

$$* a \equiv b[n] \Rightarrow b \equiv a[n] \quad \text{يعني:}$$

$$* \begin{cases} a \equiv b[n] \\ b \equiv c[n] \end{cases} \Rightarrow a \equiv c[n]$$

### خاصية (2):

ليكن  $n \in \mathbb{N}^*$

كل عدد  $a$  من  $\mathbb{Z}$  يوافق بتريديد  $n$  باقي قسمته على  $n$  يعني إذا

كان  $r$  هو باقي قسمة  $a$  على  $n$  فإن  $a \equiv r[n]$ .

### برهان:

$$\begin{cases} a = nq + r \\ 0 \leq r < n \end{cases} \quad \text{لدينا}$$

ومنه  $0 \leq r \leq b$

إذن يوجد زوج  $(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  بحيث:  $\begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$

## L'unicité (2)

نفترض أنه يوجد زوجان  $(q', r')$  و  $(q, r)$  من  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

$$\text{بحيث } \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} a = bq' + r' \\ 0 \leq r' < b \end{cases}$$

$$\text{لدينا: } bq + r = bq' + r'$$

$$b(q - q') = r' - r$$

$$\text{إذن: } |b| \cdot |q - q'| = |r' - r|$$

$$\text{ولدينا } \begin{cases} 0 \leq r < b \\ 0 \leq r' < b \end{cases} \quad \text{يعني } \begin{cases} -b < -r < 0 \\ 0 \leq r' < b \end{cases}$$

$$\text{إذن: } -b < r' - r < b$$

$$\text{يعني: } |r' - r| < b$$

$$\text{يعني: } |b| |q - q'| < b$$

$$\text{يعني: } |q - q'| < 1$$

$$\text{يعني: } |q - q'| < 1$$

ولدينا  $|q - q'| \in \mathbb{N}$  إذن  $|q - q'| = 0$

$$\text{يعني } q = q'$$

ومنه  $|r - r'| = 0$  يعني  $r = r'$

إذن  $(q, r) = (q', r')$

وبالتالي يوجد زوج وحيد  $(q, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  يحقق  $\begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$

## (b) القسمة الأقليدية في $\mathbb{Z}$ :

### مبرهنة:

ليكن  $a \in \mathbb{Z}$  و  $b \in \mathbb{N}^*$

يوجد زوج وحيد  $(q, r)$  من  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{N})$  بحيث:  $\begin{cases} a = qb + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$

### برهان:

ليكن  $a \in \mathbb{Z}$  و  $b \in \mathbb{N}^*$

## Existence (1)

\* إذا كان  $a \in \mathbb{N}$  فإنه يوجد زوج وحيد يحقق الشرط.

\* إذا كان  $a \in \mathbb{Z}^*$  فإن  $-a \in \mathbb{N}^*$

إذن يوجد زوج وحيد  $(q', r')$  من  $(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$  بحيث:

$$\begin{cases} -a = bq' + r' \\ 0 \leq r' < b \end{cases}$$

$$\text{لدينا } a = b(-q') - r'$$

$$\text{إذا كان } r' = 0 \text{ فإن } a = b(-q)$$

$$\text{نضع } q = -q' \text{ و } r = 0$$

$$\text{إذا كان } r' \neq 0$$

$$\text{فإن } a = b(-q') - r'$$

$$= b(-q') - b + b - r'$$

$$a = b(-q' - 1) + (b - r')$$

$$\text{نضع } \begin{cases} r = b - r' \\ q = -q' - 1 \end{cases} \text{ لدينا } a = bq + r$$

ولدينا  $0 < r < b$

يعني  $0 < b - r' < b$  إذن  $0 < r < b$

من خلال (1) + (2) نجد:

$$(a+c)-(b+d)=(k+k')n$$

$$a+c \equiv b+d [n] \quad \text{إذن}$$

$$c(a-b) = ckn \quad \text{* لدينا من (1):}$$

$$b(c-d) = bk'n \quad \text{ومن (2):}$$

$$ac - bd = n(ck + bk')$$

$$\text{إذن: } \frac{n}{ac-bd} \text{ ومنه } ac \equiv bd [n]$$

**ملاحظة:** ليكن  $n \in \mathbb{N}$  و  $a$  من  $\mathbb{Z}$ .

$$(\forall k \in \mathbb{Z}) \quad a \equiv a + nk [n]$$

**تمرين تطبيقي:**

$$(1) \quad \text{لنبين أن: } 7 \mid 3^{2n} - 2^n \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

$$\text{ملاحظة: } n/a \Leftrightarrow a \equiv 0 [n]$$

لدينا:

$$3^2 \equiv 9 [7]$$

$$\equiv 9 - 7 [7]$$

$$\equiv 2 [7]$$

$$\text{إذن } 3^2 \equiv 2 [7]$$

$$\text{إذن } 3^{2n} \equiv 2^n [7]$$

$$\text{إذن } (\forall n \in \mathbb{N}): 7 \mid 3^{2n} - 2^n$$

(2) لنبين أن  $17 \mid 3.5^{2n-1} + 2^{3n-2}$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}^*$

لدينا:

$$5^{2n-1} = 5^{2(n-1)+1}$$

$$= 5^{2(n-1)} \times 5$$

ولدينا:

$$5^2 \equiv 25 [17]$$

$$\equiv 8 [17]$$

$$5^2 \equiv 2^3 [17]$$

$$\text{إذن: } 5^{2(n+1)} \equiv 2^{3(n+1)} [17]$$

$$5.5^{2(n-1)} \equiv 2^{3(n-1)} \times 5 [17] \quad \text{يعني:}$$

$$5^{2n-1} \equiv 2^{3(n-1)} \times 5 [17] \quad \text{يعني:}$$

$$3.5^{2n-1} \equiv 2^{3(n-1)} \times 15 [17] \quad \text{يعني:}$$

$$3.5^{2n-1} + 2^{3n-2} \equiv 2^{3n-3} \times 15 + 2^{3n-2} [17] \quad \text{يعني:}$$

$$3.5^{2n-1} + 2^{3n-2} \equiv 2^{3n-3} (15+2) [17] \quad \text{يعني:}$$

$$\equiv 2^{3n-3} (17) [17] \quad \text{يعني:}$$

$$3.5^{2n-1} + 2^{3n-2} \equiv 0 [17] \quad \text{إذن:}$$

$$\text{إذن } (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad 17 \mid 3.5^{2n-1} + 2^{3n-2}$$

**(3) مجموعة أصناف تكافؤ:**

**(a) تعريف:**

ليكن  $a \in \mathbb{N}$  وليكن  $x \in \mathbb{Z}$

نسمي صنف تكافؤ  $x$  المجموعة التي نرمز لها بـ  $\bar{x}$  أو  $\bar{x}$  والمعرفة بما يلي:

$$\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} / y \equiv x [n]\}$$

ونرمز لمجموعة هذه الأصناف بـ:  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$\text{إذن } a - r = nq$$

$$\text{ومنه } n/a - r \quad \text{إذن } a \equiv r [n]$$

**خاصية (3):**

ليكن  $n \in \mathbb{N}^*$  و  $b, r$  من  $\mathbb{Z}$ .

ليكن  $r$  باقي قسمة  $a$  على  $n$  و  $r'$  باقي قسمة  $b$  على  $n$ .

$$\text{لدينا: } a \equiv b [n] \Leftrightarrow r = r'$$

**برهان:**

$$\text{لدينا: } \begin{cases} a = nq + r \\ 0 \leq r < n \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} b = nq' + r' \\ 0 \leq r' < n \end{cases}$$

\* نفترض أن  $r = r'$

$$\text{نعلم أن } \begin{cases} a \equiv r [n] \\ b \equiv r' [n] \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} a \equiv r [n] \\ b \equiv r' [n] \end{cases}$$

$$\text{إذن } a \equiv b [n] \quad \text{و} \quad r = r'$$

\* نفترض أن  $a \equiv b [n]$  ولنبين أن  $r = r'$

$$\text{لدينا } \begin{cases} a \equiv r [n] \\ b \equiv r' [n] \\ r = r' \end{cases} \quad \text{إذن } r \equiv r' [n]$$

أي  $r - r' = kn$  مع  $k \in \mathbb{Z}$

$$\text{إذن } |r - r'| = |k|n$$

$$\text{ولدينا } \begin{cases} 0 \leq r < n \\ 0 \leq r' < n \end{cases}$$

$$\text{إذن } -n < r - r' < n$$

$$\text{أي } |r - r'| < n$$

$$\text{يعني } |k|n < n$$

$$\text{إذن } |k| < 1$$

$$\text{ولدينا } |k| \in \mathbb{N} \quad \text{إذن } k = 0$$

$$\text{ومنه } r - r' = 0 \quad \text{إذن } r = r'$$

**خاصية (4):**

ليكن  $n \in \mathbb{N}$

$$(1) \quad (\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4) \begin{cases} a \equiv b [n] \\ c \equiv d [n] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + c \equiv b + d [n] \\ a.c \equiv b.d [n] \end{cases}$$

(2) ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$  من  $\mathbb{Z}$

$$(\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}) a_i \equiv b_i [n] \Rightarrow \begin{cases} \sum_{i=1}^n a_i \equiv \sum_{i=1}^n b_i [n] \\ \prod_{i=1}^n a_i \equiv \prod_{i=1}^n b_i [n] \end{cases}$$

$$(3) \quad (\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3) a \equiv b [n] \Rightarrow \begin{cases} a + c \equiv b + c [n] \\ a.c \equiv b.c [n] \end{cases}$$

$$(4) \quad (\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2) (\forall n' \in \mathbb{N}): a \equiv b [n] \Rightarrow a^{n'} \equiv b^{n'} [n]$$

**برهان:** لنبرهن على (1)

$$\text{نفترض أن } \begin{cases} a \equiv b [n] \\ c \equiv d [n] \end{cases}$$

$$\text{* لدينا } a \equiv b [n] \text{ يعني } (1) \quad a - b = kn \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{و} \quad c \equiv d [n] \text{ إذن } (2) \quad c - d = k'n \quad (k' \in \mathbb{Z})$$

\* لنبيين أن  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \subset \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{(n-1)}\}$

ليكن  $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

نعتبر قسمة  $x$  على  $n$ . ليكن  $r$  هو باقي قسمة  $a$  على  $n$

$$\begin{cases} x = nq + r \\ 0 \leq r < n \end{cases} \text{ أي:}$$

نعلم أن  $x \equiv r[n]$  إذن  $\bar{x} = \bar{r}$

ولدينا:  $r \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$

إذن  $\bar{r} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{(n-1)}\}$

ومنه  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \subset \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{(n-1)}\}$

بالتالي:  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{(n-1)}\}$

\* لنحدد  $\text{card } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

ليكن  $r'$  و  $r''$  من  $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$  بحيث  $r' \neq r''$

لنبيين أن  $\bar{r}' \neq \bar{r}''$

نفترض أن  $\bar{r}' = \bar{r}''$

يعني:  $r' \equiv r''[n]$

يعني:  $r - r'' = kn / k \in \mathbb{Z}$  أي  $|r - r''| = |k|n$

ولدينا  $\begin{cases} 0 \leq r < n \\ 0 \leq r'' < n \end{cases}$  إذن  $|r - r''| < n$

يعني:  $|k|n < n$

يعني  $|k| < 1$

ولدينا  $|k| \in \mathbb{N}$  إذن  $k = 0$

ومنه  $r = r''$  وهذا تناقض.

إذن  $\bar{r}' \neq \bar{r}''$

بالتالي:  $\text{Card } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = n$

خاصية:

ليكن  $n \in \mathbb{N}^*$

$$\text{Card } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = n \quad (*)$$

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{(n-1)}\} \quad (*)$$

### (c) الجمع والضرب في $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ :

ليكن  $X$  و  $Y$  من  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

نفترض أن:  $X = \bar{x} = \bar{x}'$

و:  $Y = \bar{y} = \bar{y}'$

$$\begin{cases} x \equiv x'[n] \\ y \equiv y'[n] \end{cases} \text{ إذن}$$

$$\begin{cases} x + y \equiv x' + y'[n] \\ xy \equiv x'y'[n] \end{cases} \text{ إذن}$$

$$\begin{cases} \overline{x + y} = \overline{x' + y'} \\ \overline{xy} = \overline{x'y'} \end{cases} \text{ إذن}$$

$$\begin{cases} x + y = \overline{x + y} \\ xy = \overline{xy} \end{cases} \text{ نضع إذن}$$

$$\begin{cases} \bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y} \\ \bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy} \end{cases} \text{ يعني:}$$

$$\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} / y \equiv x[3]\}$$

$$= \{y \in \mathbb{Z} / y = x + 3k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} / y = x + 3k / k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{إذن}$$

$$\bar{0} = \{3k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$$

$$\bar{1} = \{1 + 3k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{\dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, \dots\}$$

$$\bar{2} = \{2 + 3k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{\dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, \dots\}$$

$$\bar{3} = \{3 + 3k / k \in \mathbb{Z}\}$$

$$= \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\} = \bar{0}$$

### (b) خاصيات:

-1 ليكن  $n \in \mathbb{N}$  و  $x \in \mathbb{Z}$

$$\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} / y \equiv x[n]\}$$

$$y \in \bar{x} \Leftrightarrow y \equiv x[n] \Leftrightarrow y = x + nk / k \in \mathbb{Z}$$

$$\bar{x} = \{x + nk / k \in \mathbb{Z}\} \quad \text{إذن:}$$

-2 ليكن  $n \in \mathbb{N}$  و  $y, x$  من  $\mathbb{Z}$

لنبيين أن:  $\bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow x \equiv y[n]$

\* ( $\Leftarrow$ ) نفترض أن  $x \equiv y[n]$  ولنبيين أن  $\bar{x} = \bar{y}$

$$z \in \bar{x} \Leftrightarrow z \equiv x[n]$$

$$\Leftrightarrow z \equiv y[n] \quad (x \equiv y[n])$$

$$\Leftrightarrow z \in \bar{y}$$

إذن  $\bar{x} = \bar{y}$

\* ( $\Rightarrow$ ) نفترض أن  $\bar{x} = \bar{y}$  ولنبيين أن  $x \equiv y[n]$

لدينا  $\bar{x} = \bar{y}$  إذن يوجد  $z$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $z \in \bar{x}$  و  $z \in \bar{y}$

$$\text{إذن} \quad \begin{cases} z \equiv x[n] \\ z \equiv y[n] \end{cases} \text{ إذن} \quad x \equiv y[n]$$

-3 ليكن  $n \in \mathbb{N}$  و  $x, y$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $x \not\equiv y[n]$

لنبيين أن:  $\bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$

- نفترض أن  $\bar{x} \cap \bar{y} \neq \emptyset$

$$\text{إذن يوجد} \quad \begin{cases} z \equiv x[n] \\ z \equiv y[n] \end{cases} \text{ إذن} \quad z \in \bar{x} \cap \bar{y}$$

وهذا غير صحيح. إذن  $\bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$

### خاصية:

ليكن  $n \in \mathbb{N}$  و  $x, y$  من  $\mathbb{Z}$

$$\bar{x} = \{x + nk / k \in \mathbb{Z}\} \quad (1)$$

$$\bar{x} = \bar{y} \Leftrightarrow x \equiv y[n] \quad (2)$$

$$\bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset \Leftrightarrow x \not\equiv y[n] \quad (3)$$

هذا يعني أن صفتي تكافؤ منطبقان أو منفصلتان.

-4 تحديد  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  مع  $n \in \mathbb{N}^*$

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{(n-1)}\}$$

\* لدينا:

$$\{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{(n-1)}\} \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

**تعريف:**

تعريف الجمع والضرب في  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  بما يلي:

$$\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$$

**مثال:**

ضع جدول الجمع والضرب في  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

- لدينا:  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$

↗+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$

↗x	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

**تمرين تطبيقي:**

(\* حل في  $\mathbb{Z}$  المعادلة:  $4x \equiv 2[6]$   
لدينا في  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ :

$$4x \equiv 2[6] \Leftrightarrow \bar{4}x = \bar{2}$$

$$\Leftrightarrow \bar{4} \cdot \bar{x} = \bar{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x} = \bar{2} \\ \bar{x} = \bar{5} \end{cases} \quad (\text{من خلال الجدول})$$

$$\Leftrightarrow x \equiv 2[6] \text{ أو } x \equiv 5[6]$$

$$\Leftrightarrow x = 2 + 6k \text{ أو } x = 5 + 6k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{إن: } S = \{2 + 6k, 5 + 6k / k \in \mathbb{Z}\}$$

(\* حل في  $\mathbb{Z}$  المعادلة:

$$3x \equiv 1[5]$$

لدينا في  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

$$3x \equiv 1[5] \Leftrightarrow \bar{3}x = \bar{1}$$

$$\Leftrightarrow \bar{3} \cdot \bar{x} = \bar{1}$$

لدينا:  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$

بالتعويض نستنتج أن:

$$\bar{x} = \bar{2}$$

$$x \equiv 2[5]$$

يعني

$$x = 2 + 5k$$

يعني

$$S = \{2 + 5k / k \in \mathbb{Z}\}$$

إن

**خصائص:**

(\* الجمع والضرب وتبادليان في  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

(\* الضرب توزيعي بالنسبة للجمع في  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

(\*  $\bar{0}$  هو العنصر المحايد بالنسبة للجمع.

(\*  $\bar{1}$  هو العنصر المحايد بالنسبة للضرب.

(\*  $\bar{x}$  يقبل مقابل  $\overline{-x}$  ونرمز له ب  $-\bar{x}$ .

تلخص هذه الخصائص بقولنا  $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$  حلقة تبادلية وواحدية.

**برهان:**

- لنبين أن (+) تجميعي.

لدينا:

$$\bar{x} + (\bar{y} + \bar{z}) = \overline{\bar{x} + (y + z)}$$

$$= \overline{x + (y + z)} = \overline{(x + y) + z}$$

$$= \overline{(x + y)} + \bar{z}$$

$$\bar{x} + (\bar{y} + \bar{z}) = (\bar{x} + \bar{y}) + \bar{z} \quad \text{إن}$$

**ملاحظة:**

$$(\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2) \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{0} \Rightarrow \bar{x} = \bar{0} \text{ أو } \bar{y} = \bar{0}$$

**مثل مضاد:**

في  $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$  لدينا  $\bar{3} \cdot \bar{4} = \bar{0}$

و  $\bar{3} \neq \bar{0}$  و  $\bar{4} \neq \bar{0}$

**III- القاسم المشترك الأكبر.**

**(1) تعريف:**

ليكن  $b$  و  $a$  من  $\mathbb{Z}^*$

نعتبر المجموعة  $A = \{d \in \mathbb{N}^* / d / a \text{ و } d / b\}$

(\* لدينا  $A \neq \emptyset$  (لأن  $1 \in A$ )

(\* لدينا:  $(\forall d \in A) d / a$

إن  $d \leq |a|$

إن  $A$  مكبورة ب  $|a|$

(\* ولدينا  $A \subset \mathbb{N}$

إن  $A$  تقبل أكبر عنصر.

نضع  $\delta = \max A$

$\delta$  يسمى القاسم المشترك الأكبر ل  $b$  و  $a$

ونكتب  $\delta = a \wedge b$

**تعريف:**

ليكن  $b$  و  $a$  من  $\mathbb{Z}^*$

نسمي القاسم المشترك الأكبر ل  $b$  و  $a$  أكبر قاسم موجب قطعاً

مشترك بين  $b$  و  $a$ . نرمز له ب  $a \wedge b$  أو  $a \Delta b$  أو  $\text{pgcd}\{a, b\}$

**مثال:**

لنحدد  $48 \wedge 36$

القواسم الموجبة ل 48 هي: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24,

48.

القواسم الموجبة ل 36 هي: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

إن القواسم المشتركة: 1, 2, 3, 4, 6, 12. إن  $48 \wedge 36 = 12$

**ملاحظة:**

$a \wedge b = b \wedge a$  (\*)

$0 \wedge b = |b|$  إذا كان  $b \neq 0$  نضع (\*)

$0 \wedge 0$  غير معرف. (\*)

$a \wedge b = |a|$  فإن  $a/b$  (\*)

$a \wedge b = d$  يعني  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  وإذا كان  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  فإن  $d' \leq d$  (\*)

**(2) خاصيات:**

$\mathbb{Z}^*$  -1 ليكن  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$

ليكن  $d = a \wedge b$

لنبين أنه يوجد  $(u, v)$  من  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  بحيث  $d = au + bv$

\* نعتبر المجموعة:  $A = \{au + bv / u, v \in \mathbb{Z}\}$

- لدينا  $A \neq \emptyset$  لأن  $n = a^2 + b^2 \in A$

- لدينا  $A$  مصغورة ب 1.

- ولدينا  $A \subset \mathbb{N}$

إذن لدينا  $p$  صاغر ل  $A$

و  $p \in A$  إذن يوجد  $(u, v)$  من  $\mathbb{Z}^2$  بحيث  $p = au + bv$

\* لنبين أن  $d = p$

- لدينا  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  إذن  $\begin{cases} d/au \\ d/bv \end{cases}$  يعني  $d/p$

إذن  $|d| \leq |p|$  يعني  $d \leq p$  (1)

- لنبين أن  $p/a$

نعتبر القسمة الأقليدية ل  $a$  على  $p$  يعني  $\begin{cases} a = pq + r \\ 0 \leq r < p \end{cases}$

لنبين أن  $r = 0$ : نفترض أن  $r \neq 0$  إذن  $0 < r < p$

$r = a - pq$

$= a - (au + bv)q$

$= a(1 - uq) + b(-Vq)$

لدينا:

لدينا  $\begin{cases} r = aU + bV \\ r \in \mathbb{N}^* \end{cases}$  إذن  $r \in A$  ولدينا  $r < p$  و  $p = \sin A$

هذا تناقض. إذن  $r = 0$ .

ومنه  $p/a$

وبنفس الطريقة نبين أن  $p/b$

إذن  $p$  قاسم مشترك ل  $b$  و  $a$  و  $a \wedge b = d$

إذن  $p \leq d$  (2)

من (1) و (2) نستنتج أن:  $p = d$

إذن:  $d = au + bv$

**خاصية (1):**

ليكن  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$

إذا كان  $a \wedge b = d$  فإنه يوجد زوج  $(u, v)$  من  $\mathbb{Z}^2$  بحيث:

$d = au + bv$

**ملاحظة:**

ليكن  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$  وليكن  $d = a \wedge b$

\* العدد  $d$  هو أصغر عدد طبيعي غير منعدم يكتب على شكل

$d = au + bv$

\* الزوج  $(u, v)$  ليس وحيدا.

-2 ليكن  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$  و  $d = a \wedge b$

لنبين أن:  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases} \Leftrightarrow d/d$

(\*) نفترض أن  $d/d$

ولدينا  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  إذن:  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$

(\*) نفترض أن  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$

لدينا  $d = a \wedge b$  إذن  $d = au + bv$  مع  $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$

لدينا  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  أن  $\begin{cases} d/au \\ d/bv \end{cases}$  إذن  $d/au + bv$  يعني  $d/d$

**خاصية (2):**

ليكن  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$  و  $d = a \wedge b$

لدينا:  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases} \Leftrightarrow d/d$

وهذا يعني أن القواسم المشتركة ل  $b$  هي بالضبط قواسم  $d$

$\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases} \Leftrightarrow d/a \wedge b$

**ملاحظة:**

ليكن  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$

(\*) لدينا:  $|a \wedge b| = a \wedge |b| = |a| \wedge b = a \wedge b$

برهان:

لنبين أن:  $|a \wedge b| = a \wedge b$

نضع  $d = a \wedge b$  و  $d' = |a \wedge b|$

- لدينا  $d = a \wedge b$  إذن  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$

ولدينا:  $\begin{cases} a/|a| \\ b/|b| \end{cases}$  إذن  $\begin{cases} d/|a| \\ d/|b| \end{cases}$  يعني  $d/|a| \wedge |b|$

يعني  $d/d'$  (1)

- لدينا  $d' = |a \wedge b|$  إذن  $\begin{cases} d'/a \\ d'/b \end{cases}$  ولدينا  $\begin{cases} |a|/a \\ |b|/b \end{cases}$

إذن  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  يعني  $d/a \wedge b$  يعني  $d/d'$  (2)

من (1) و (2) نستنتج أن  $|d| = d'$

إذن:  $a \wedge b = |a \wedge b|$

(\*) إذن يلغي البحث عن طرق تحديد القاسم المشترك الأكبر لعددين موجبين.

**(5) خوارزمية إقليدس:**

**خاصية (1)**

ليكن  $b$  من  $\mathbb{N}^*$

إذا كان  $r$  هو باقي قيمة  $a$  على  $b$  يعني:  $\begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases}$

فإن  $a \wedge b = b \wedge r$

نفترض أن  $r_{n+1}$  أول باقي منعدم.

يعني:  $r_{n+1} = 0$  و  $r_n \neq 0$

$$a \wedge b = b \wedge r_1 \quad 0 \leq r_1 < b \quad a = bq_1 + r_1$$

$$b \wedge r_1 = r_1 \wedge r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1 \quad b = r_1q_2 + r_2$$

$$r_n / r_{n-1} \text{ إذن } r_{n+1} = 0 \text{ لدينا } r_{n+1} = r_nq_{n+1} + r_{n+1}$$

ومنه  $r_{n-1} \wedge r_n = r_n$

إذن  $a \wedge b = r_n$  وهو آخر باقي غير منعدم.

### خاصية:

ليكن  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{N}^*$

القاسم المشترك الأكبر هو آخر باقي غير منعدم في القسامات المتتالية (خوارزمية أقليدس).

### ملاحظة:

نلخص هذه النتائج في الجدول:

$a$	$b$	$r_1$	$r_2$	...	...	...
	$q_1$	$q_2$	$q_3$			
$r_1$	$r_2$	$r_3$	-	-	$r_n$	0

### مثال:

لنحدد:  $792 \wedge 36$

لدينا:

792	36	16	4
	21	2	4
16	4	0	

إذن:  $792 \wedge 36 = 4$

### (4) الأعداد الأولية فيما بينها:

#### (a) تعريف:

ليكن  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$

نقول إن  $a$  و  $b$  أوليان فيما بينهما إذا فقط إذا كان  $a \wedge b = 1$

### مثال: $9 \wedge 4 = 1$

إذن 9 و 4 أوليان فيما بينهما.

#### (b) خاصيات:

#### مبرهنة (1): (مبرهنة Bezout)

ليكن  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$a \wedge b = 1 \Leftrightarrow (\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2): 1 = au + bv$$

### برهان:

( $\Rightarrow$ ) نفترض أن  $a \wedge b = 1$  من خلال خاصية سابقة نستنتج أن:

$$(\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2): 1 = au + bv$$

( $\Leftarrow$ ) نفترض أن  $(\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2): 1 = au + bv$  لنبين أن  $a \wedge b = 1$

نضع  $a \wedge b = d$  ولنبين أن:  $d = 1$

$$\text{لدينا: } \begin{cases} d / au \\ d / bv \end{cases} \text{ إذن } \begin{cases} d / a \\ d / b \end{cases} \text{ أو } d / au + bv \text{ أو } d = -1$$

يعني  $d / 1$

$$d = -1 \text{ أو } d = 1$$

ولدينا  $d > 0$  إذن  $d = 1$  يعني  $a \wedge b = 1$ .

### مثال:

ليكن  $n \in \mathbb{Z}$  مع  $n \neq -1$  و  $n \neq 0$ . لنحدد:  $(n+1) \wedge n$

$$\text{لدينا: } 1(n+1) - 1(n) = 1$$

$$\text{إذن } (n+1) \wedge (n) = 1$$

### برهان:

$$\text{لدينا } \begin{cases} a = bq + r \\ 0 \leq r < b \end{cases} \text{ لنبين أن } a \wedge b = b \wedge r$$

نضع:  $d = d'$  لنبين أن  $d' = b \wedge r$  و  $d = a \wedge b$

$$\text{- لدينا: } \begin{cases} d' / a \\ d' / r \end{cases} \text{ إذن } \begin{cases} d' / bq \\ d' / r \end{cases} \text{ إذن } d' / bq + r$$

يعني  $d' / a$

$$\text{إذن } \begin{cases} d' / a \\ d' / b \end{cases} \text{ يعني } d' / a \wedge b \text{ يعني } d' / d \quad (1)$$

$$\text{- لدينا } \begin{cases} d / a \\ d / b \end{cases} \text{ إذن } \begin{cases} d / a \\ d / bq \end{cases} \text{ إذن } d / a - bq \text{ يعني}$$

$$\begin{cases} d / b \\ d / r \end{cases} \text{ إذن } d / r \text{ يعني: } d / b \wedge r$$

$$(2) \quad d / d'$$

من (1) و (2) نستنتج أن  $|d| = |d'|$

وبما أن  $d$  و  $d'$  وجبان قطعاً فإن  $d = d'$

$$\text{يعني } a \wedge b = b \wedge r$$

### ملاحظة:

في البرهان م نستعمل كون  $0 \leq r < b$ . إذن بصفة عامة:

$$\text{إذا كان } a = bq + r \text{ فإن } a \wedge b = b \wedge r$$

مثال:

لنحدد  $416 \wedge 76$

لدينا

$$\text{إذن } 416 = 76 \times 5 + 36$$

$$416 \wedge 76 = 76 \wedge 36$$

$$\text{ولدينا: } 76 = 2 \times 36 + 4$$

$$416 \wedge 36 = 36 \wedge 4$$

$$\text{ولدينا } 36 = 9 \times 4 + 0$$

$$\text{إذن: } 4 / 36 \text{ ومنه: } 36 \wedge 4 = |4| = 4$$

$$\text{بالتالي: } 76 \wedge 36 = 4$$

$$\text{أي: } 416 \wedge 76 = 4$$

نلخص هذا في الجدول التالي:

416	76	36	4
	5	2	9
36	4	0	

### تعميم:

ليكن  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{N}^*$  بحيث  $a > b$

\* نقوم بقسمة  $a$  على  $b$ :  $a = bq_1 + r_1$  ,  $0 \leq r_1 < b$

- إذا كان  $r_1 = 0$  فإن  $b / a$  إذن  $a \wedge b = b$

- إذا كان  $r_1 \neq 0$  فإن  $a \wedge b = b \wedge r_1$

نقوم بقسمة  $b$  على  $r_1$ :  $b = r_1q_2 + r_2$  ,  $0 \leq r_2 < r_1$

- إذا كان  $r_2 = 0$  فإن  $r_1 / b$  إذن  $b \wedge r_1 = r_1$

- إذا كان  $r_2 \neq 0$  فإن  $b \wedge r_1 = r_1 \wedge r_2$

وهكذا نتائج القسامات المتتالية حتى نحصل على باقي منعدم (ومن

الضروري الحصول على باقي منعدم لأن هذه البواقي موجبة

وتناقصية قطعاً).

**ملاحظة:**

ليكن  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$  و  $d = a \wedge b$

$$a' \wedge b' = \frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1 \quad \text{إذن} \quad \begin{cases} a' = \frac{a}{d} \\ b' = \frac{b}{d} \end{cases} \quad \text{لدينا} \quad \begin{cases} a = da' \\ b = db' \end{cases}$$

نضع:

$$a' \wedge b' = 1 \quad \text{فإن} \quad \begin{cases} d = a \wedge b \\ a = da' \\ b = db' \end{cases}$$

إذن إذا كان  $a = da'$  و  $b = db'$  فإن  $d = a \wedge b$

**مبرهنة (4):**

ليكن  $a$  و  $b$  و  $c$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$\begin{cases} a \wedge b = 1 \\ a \wedge c = 1 \end{cases} \Rightarrow a \wedge bc = 1$$

لدينا:

**برهان:**

لدينا  $a \wedge b = 1$  إذن:  $(\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2): (1) \quad 1 = au + bv$

و  $a \wedge c = 1$  إذن:  $(\exists (u', v') \in \mathbb{Z}^2): (2) \quad 1 = au' + cv'$

من (1) . (2) نستنتج أن:

$$1 = a^2uu' + acuv' + bau'v + bcvv'$$

$$1 = a(auu' + cuv' + bu'v) + bc(vv')$$

يعني

$$1 = aU + bcV$$

وحسب (Bezout) نستنتج أن:

$$a \wedge bc = 1$$

**ملاحظة:**

الاستلزام العكسي صحيح.

**استنتاج:**

1- ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n$  و  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$(\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}) a_i b_i = 1 \Rightarrow a \wedge \prod_{i=1}^n b_i = 1$$

2- ليكن  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$(\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2) \quad a \wedge b = 1 \Rightarrow a^m \wedge b^n = 1$$

**مبرهنة (5): (مبرهنة Gauss)**

ليكن  $a$  و  $b$  و  $c$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$\begin{cases} a/c \\ b/c \end{cases} \Rightarrow ab/c$$

لدينا:

$$a \wedge b = 1$$

**ملاحظة:**

إذا كان  $a \wedge b \neq 1$  فإن الاستلزام خاطئ:

مثلا:  $\begin{cases} 6/12 \\ 4/12 \end{cases}$  لكن  $6.4 \times 12$

**برهان:**

لدينا  $a/c$  إذن  $\exists k \in \mathbb{Z} \quad c = ak$

و  $b/ak$  يعني  $b/c$

ولدينا  $a \wedge b = 1$  إذن حسب (Gauss) نستنتج أن  $b/k$

إذن  $k = bk'$

ومنه  $c = abk'$

إذن  $ab/c$

**مبرهنة (2)**

ليكن  $a$  و  $b$  و  $c$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$ac \wedge bc = |c|(a \wedge b)$$

لدينا

**برهان:**

نضع  $d' = a \wedge b$  و  $a \in bd'$  و  $b \in ad'$

لنبين أن  $d = |c|d'$

لدينا  $\begin{cases} d'/a \\ d'/b \end{cases}$  ولدينا  $|c|/c$

يعني  $\begin{cases} |c|d'/ac \\ |c|d'/bc \end{cases}$

$$|c|d'/ac \wedge bc$$

يعني  $|c|d'/d$  (1)

لدينا:  $d' = a \wedge b$  إذن:  $d' = au + bv$  ( $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2$ ):

إذن  $|c|d' = |c|au + |c|bv$

ولدينا:  $d = ac \wedge bc$

لدينا  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  إذن  $\begin{cases} d/a|c \\ d/b|c \end{cases}$  إذن  $\begin{cases} d/a|c|u \\ d/b|c|v \end{cases}$

إذن  $d/a|c|u + b|c|v$

يعني:  $d/d'|c|$  (2)

من (1) و (2) نستنتج أن:  $d = |c|d'$  (لأنهما عددان موجبان)

**مبرهنة (3):**

ليكن  $a$  و  $b$  و  $d$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$a \wedge b = d \Leftrightarrow \begin{cases} d/a \text{ et } d/b \\ \frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1 \end{cases}$$

**برهان:**

( $\Leftarrow$ ) نفترض أن  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  و  $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$  ولنبين  $a \wedge b = d$

لدينا:  $a \wedge b = d \cdot \frac{a}{d} \wedge d \cdot \frac{b}{d} = |d| \left( \frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} \right) = d \cdot 1 = d$

إذن:  $a \wedge b = d$

( $\Rightarrow$ ) نفترض أن  $a \wedge b = d$  لنبين أن  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$  و  $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$

- لدينا  $a \wedge b = d$  إذن  $\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases}$

- لدينا  $a \wedge b = d$  إذن  $(\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2): d = au + bv$

يعني:  $d = d \cdot \frac{a}{d}u + d \cdot \frac{b}{d}v$

يعني:  $d = d \left( \frac{a}{d}u + \frac{b}{d}v \right)$

يعني:  $1 = \frac{a}{d}u + \frac{b}{d}v$

وحسب (Bezout) نستنتج أن  $\frac{a}{d} \wedge \frac{b}{d} = 1$



**ملاحظة:**

$$\begin{cases} a_1/b \\ a_2/b \\ \vdots \\ a_n/b \end{cases} \Rightarrow a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n / b$$

أولية فيما بينها مثلى مثلى

**ميرهنة (7):**ليكن  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{Z}^*$  و  $n \in \mathbb{N}^*$ 

$$\begin{cases} ax \equiv ay [n] \\ a \wedge n = 1 \end{cases} \Rightarrow x \equiv y [n]$$

**ملاحظة:**إذا كان  $a \wedge n + 1$  فإن الاستلزام خاطئ.مثل:  $3 \cdot 2 \equiv 3 \cdot 4 [6]$  لكن  $2 \not\equiv 4 [6]$ 

برهان:

لدينا  $ax \equiv ay [n]$  يعني  $n/ax - ay$ يعني  $n/a(x - y)$ ولدينا  $a \wedge n = 1$  إذن حسب (Gauss) نستنتج أن:

$$n/x - y$$

يعني  $x \equiv y [n]$ 

$$\begin{cases} ax \equiv ay [n] \\ a \wedge n = 1 \end{cases} \Rightarrow x \equiv y [n]$$

**(5) حل المعادلة  $ax + by = c$  في  $\mathbb{N}$ .****(a) أمثلة:****مثال 1:** لنحل في  $\mathbb{Z}^2$  المعادلة  $3x - 4y = 1$  (1).\* لدينا  $3 \wedge 4 = 1$  إذن حسب Bezout يوجد زوج  $(u, v)$  من  $\mathbb{Z}$ .بحيث:  $3u + 4v = 1$ يعني:  $3u - 4(-v) = 1$ إذن  $(u, -v)$  حل للمعادلة (1)

وبالتالي المعادلة (1) تقبل حلا على الأقل.

\* لنبحث عن حل خاص للمعادلة (1).

نلاحظ أن  $(-1, -1)$  حل للمعادلة (1).

\* لنحدد جميع الحلول:

ليكن  $(x, y)$  حل للمعادلة (1).

$$(2) \quad 3(-1) - 4(-1) = 1$$

ولدينا  $(-1, -1)$  حل إذن:  $(3) \quad 3(-1) - 4(-1) = 1$ من (3) - (2) نستنتج أن:  $3(x+1) - 4(y+1) = 0$ 

$$3(x+1) = 4(y+1) \text{ يعني}$$

$$\frac{3}{4}(y+1)$$

ولدينا  $3 \wedge 4 = 1$  إذن حسب (Gauss) لدينا:  $3/y + 1$ .يعني  $y + 1 = 3k$  يعني:  $y = 3k - 1$ 

وبالتعويض في (2) نحصل على:

$$3x - 4(3k - 1) = 1$$

$$3x = 12k - 3 \text{ يعني}$$

$$x = 4k - 1 \text{ يعني}$$

$$\begin{cases} y = 3k - 1 \\ x = 4k - 1 \end{cases} \text{ (} k \in \mathbb{Z} \text{) إذن:}$$

**عكسا**نلاحظ أنه تم حساب  $x$  انطلاقا من المعادلة (2) إذن  $x$  و  $y$ 

يحققان المعادلة (1)

وبالتالي:  $S = \{(4k - 1; 3k - 1) / k \in \mathbb{Z}\}$ **مثال 2:**لنحل في  $\mathbb{Z}^2$  المعادلة:  $67x + 57y = 2$  (E)\* لنحدد  $67 \wedge 57$ 

67	57	10	7	3	1
	1	5	1	2	3
10	7	3	□	0	

إذن  $67 \wedge 57 = 1$ وحسب Bezout فإنه يوجد  $(u, v)$  بحيث  $67u + 57v = 1$ يعني  $67(2u) + 57(2v) = 2$ إذن الزوج  $(2u, 2v)$  حل للمعادلة (E).

إذن (E) تقبل حلا على الأقل.

\* لنبحث عن حل خاص للمعادلة (E).

خوارزمية أقليدس تمكننا من البحث عن حل خاص إذا لم يكن هناك حل واضح.

$$(1) \quad 67 = 1 \times 57 + 10$$

$$(2) \quad 57 = 5 \times 10 + 7$$

$$(3) \quad 10 = 1 \times 7 + 3$$

$$(4) \quad 7 = 2 \times 3 + 1$$

نضع  $b = 57$  و  $a = 67$ من (1) نحصل على:  $10 = a - b$ من (2) نحصل على:  $7 = 6b - 5a$  أي  $b = 5(a - b) + 7$ من (3) نحصل على:  $3 = 6a - 7b$  أي  $a - b = (6b - 5a) + 3$ من (4) نحصل على:  $1 = 6b - 5a = 2(6a - 7b) + 1$  أي

$$-17a + 20b = 1$$

يعني:  $67(-17) + 57(20) = 1$ يعني:  $67(-34) + 57(40) = 2$ إذن  $(-34, 40)$  حل للمعادلة (E).

\* لنحدد جميع حلول المعادلة (E).

ليكن  $(x, y)$  حل للمعادلة.

$$(1) \quad 67x + 57y = 2 \text{ إذن}$$

ولدينا  $(-34, 40)$  حل إذن:

$$(2) \quad 67(-34) + 57(40) = 2$$

من (1) - (2) نستنتج أن:

$$67(x + 34) + 57(y - 40) = 0$$

$$67(x + 34) = -57(y - 40) \text{ يعني}$$

$$\frac{57}{67}(x + 34)$$

وبما أن  $57 \wedge 67 = 1$  فإن  $57/x + 34$ 

$$x + 34 = 57k \text{ أي}$$

$$x = 57k - 34 \text{ إذن}$$

وبالتعويض في (1) نجد:

$$57y = -67 \times 57k + 2280$$

$$y = -67k + 40 \text{ ومنه}$$

## 2- خاصيات:

### خاصية (1):

ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$d = a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n \Rightarrow \exists (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{Z}^n / d = \sum_{i=1}^n a_i u_i$$

### خاصية (2):

ليكن:  $d = a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$

قواسم  $d$  هي بالضبط القواسم المشتركة للأعداد  $a_i$

$$\begin{cases} d'/a_1 \\ d'/a_2 \\ \vdots \\ d'/a_n \end{cases} \Leftrightarrow d'/a_1 \wedge d'/a_2 \wedge \dots \wedge d'/a_n = d$$

### خاصية (3):

ليكن  $a, b, c$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$a \wedge b \wedge c = (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

لدينا: هذا يعني أنه عندك حساب القاسم المشترك الأكبر لعدة أعداد يمكن تعويض كل اثنين بالقاسم المشترك الأكبر لهما.

### (3) الأعداد الأولية فيما بينها:

#### (a) تعريف:

نقول إن الأعداد  $a_1, a_2, \dots, a_n$  من  $\mathbb{Z}^*$  أولية فيما بينها إذا فقط إذا كان

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n = 1$$

#### لاحظة:

لا يجب الخلط بين أعداد أولية فيما بينها وأعداد أولية فيما بينها متنى متنى.

**مثلا:** الأعداد 9, 12, 16, 4, 30 أولية فيما بينها.

لكنها ليست أولية فيما بينها متنى متنى.

### (b) خاصيات:

#### خاصية (1):

ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n$  من  $\mathbb{Z}^*$

$$a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n = 1 \Leftrightarrow \exists (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{Z}^n / 1 = \sum_{i=1}^n a_i u_i$$

#### خاصية (2):

ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n$  من  $\mathbb{Z}^*$  و  $d > 0$

$$d = a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n \Leftrightarrow \begin{cases} d/a_1 \text{ et } d/a_2 \dots d/a_n \\ \frac{a_1}{d} \wedge \frac{a_2}{d} \wedge \dots \wedge \frac{a_n}{d} = 1 \end{cases}$$

### (V) المضاعف المشترك الأصغر:

#### (1) تعريف:

ليكن  $a, b$  من  $\mathbb{Z}^*$

ونعتبر المجموعة  $E = \{m \in \mathbb{N}^* / a/m \text{ et } b/m\}$

- لدينا  $E \neq \emptyset$  (لأن  $|ab| \in E$ )

-  $E$  مصغورة ب 0.

-  $E \subset \mathbb{N}$

إذن  $E$  تقبل الأصغر عنصر نضع:  $q = \min E$

$q$  يسمى المضاعف المشترك الأصغر ل  $a, b$ . ونكتب

$$q = a \vee b$$

$$\begin{cases} x = 57k + 34 \\ y = -67k + 40 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

إذن:

عكسيا:  $(x, y)$  يحققان  $(E)$  لأنه تم تحديد  $y$  انطلاقا من  $(E)$

\* وبالتالي:  $S = \{(57k + 34; -67k + 40) / k \in \mathbb{Z}\}$

### (b) تعميم:

نعتبر المعادلة  $(E)$   $ax + by = c$  مع  $a \neq 0$  و  $b \neq 0$

- نضع  $d = a \wedge b$

-1 إذا كان  $d \times c$

نفترض أن المعادلة تقبل حلا  $(x, y)$ .

$$ax + by = c$$

إذن

$$\text{ولدينا } \begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases} \text{ إذن } \begin{cases} d/ax \\ d/by \end{cases} \text{ إذن } d/ax + by \text{ يعني } d/c$$

وهذا تناقض. إذن المعادلة ليس لها حل.

-2 إذا كان  $d/c$

$$\text{نضع: } \begin{cases} a = da' \\ b = db' \\ c = dc' \end{cases} \text{ مع } a' \wedge b' = 1$$

إذن  $(E)$  تصبح:

$$a'x + b'y = c'$$

أي

\* لدينا  $a' \wedge b' = 1$

إذن يوجد  $(u, v)$  بحيث  $a'u + b'v = 1$

$$\text{يعني: } a'(c'u) + b'(c'v) = c'$$

إذن  $(c'u, c'v)$  حل للمعادلة  $(E')$ .

إذن لها حل.

\* لنبحث عن حل خاص:

باستعمال خوارزمية أقليدس إذا لم يكن هناك حل واضح.

نفترض أن  $(x_0, y_0)$  حل خاص للمعادلة.

$$\text{يعني } (1) \quad a'x_0 + b'y_0 = c'$$

\* ليكن  $(x, y)$  حل للمعادلة يعني:  $(2) \quad a'x + b'y = c'$

من (1) و (2) نجد:  $a'(x - x_0) + b'(y - y_0) = 0$

$$\text{يعني: } a'(x - x_0) = -b'(y - y_0)$$

$$\text{إذن } b'/a'(x - x_0)$$

ولدينا  $a' \wedge b' = 1$  إذن  $b'/(x - x_0)$  يعني  $x = b'k + x_0$

وبالتعويض في  $(E')$  نجد

$$a'(b'k + x_0) + b'y = c'$$

$$b'y = c' - a'x - a'b'k$$

يعني:

$$\text{ولدينا من (1): } a'x_0 = c' - b'y_0$$

$$\text{إذن } b'y = c' - c' + b'y_0 - a'b'k$$

$$\text{إذن } y = -a'k + y_0$$

عكسيا:  $(x, y)$  يحقق  $(E)$  لأنه تم حساب  $y$  انطلاقا من  $(E)$

$$\text{وبالتالي: } S = \{(b'k + x_0, -a'k + y_0) / k \in \mathbb{Z}\}$$

### (IV) القاسم المشترك الأكبر لعدة أعداد:

#### 1- تعريف:

ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n$  أعداد غير منعدمة

نسمى القاسم المشترك الأكبر لهذه الأعداد أكبر قاسم مشترك

موجب قطعاً لهذه الأعداد. ونرمز له ب  $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$

يعني:  $\gamma\alpha = \varphi\beta$

إذن  $\alpha/\varphi\beta$

ولدينا  $\alpha \wedge \beta = 1$  إذن  $\alpha/\varphi$  يعني:  $\varphi = dk$

إذن:  $m = \varphi b$

يعني:  $m = \alpha k \beta d$  إذن  $\alpha\beta d/m$  (1)

\* لنبين أن  $m/\alpha\beta d$

لدينا:  $\alpha\beta d = \alpha b$  و  $\alpha\beta d = \beta a$  إذن  $\begin{cases} b/\alpha\beta d \\ a/\alpha\beta d \end{cases}$  إذن

$avb/\alpha\beta d$

يعني:  $m/\alpha\beta d$  (2)

من (1) و (2) نستنتج أن:

$$|m| = |\alpha\beta d|$$

يعني:  $m = |\alpha\beta d|$

يعني:  $dm = |\alpha\beta d^2|$

يعني:  $dm = |ab|$

ومنه:  $(a \wedge b).(a \vee b) = |ab|$

### خاصية (3):

ليكن  $a, b$  من  $\mathbb{Z}^*$

لدينا:  $ac \vee bc = |c|(a \vee b)$

### برهان:

نعلم أن:  $(ac \wedge bc)(ac \vee bc) = |ac.bc|$

يعني:  $|c|(a \wedge b).(ac \vee bc) = |ab|.|c|^2$

يعني:  $(a \wedge b).(ac \vee bc) = (a \wedge b)(a \vee b)|c|$

يعني:  $(ac \vee bc) = |c|. (a \vee b)$

تمرين:

ليكن  $a, b$  من  $\mathbb{Z}^*$  و  $m > 0$

$$m = a \vee b \Leftrightarrow \begin{cases} a/m \text{ et } b/m \\ \frac{m}{a} \wedge \frac{m}{b} = 1 \end{cases}$$

### (3) المضاعف المشترك الأصغر لعدة أعداد:

#### تعريف:

ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n$  من  $\mathbb{Z}^*$

المضاعف المشترك الأصغر لهذه الأعداد هو أصغر مضاعف

موجب مشترك بين هذه الأعداد.

#### خاصية:

ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n$  من  $\mathbb{Z}^*$  و  $m = a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$

مضاعفات  $m$  هي بالضبط المضاعفات المشتركة للأعداد  $a_i$ .

## (VI) الأعداد الأولية:

### (1) تعريف:

#### تعريف (1):

ليكن  $d$  من  $\mathbb{Z}^*$ .

نسمي قاسم فعلي ل  $a$  كل قاسم  $d$  ل  $a$  يخالف  $a, -a, 1, -1$ .

يعني  $d \notin \{a, -a, 1, -1\}$ .

#### تعريف (2):

ليكن  $p \in \mathbb{Z}^* - \{-1, 1\}$

نقول إن  $p$  أولي إذا وفقط إذا كان لا يقبل أي قاسم فعلي يعني إذا

كان يقبل 4 قواسم بالضبط هي  $1, -1, p, -p$ .

### (1) تعريف:

ليكن  $a, b$  من  $\mathbb{Z}^*$

نسمي المضاعف المشترك الأصغر للعددين  $a, b$  أصغر

مضاعف موجب مشترك بين  $a, b$ . ونرمز له ب  $a \vee b$ .

### \* ملاحظة:

$$\begin{cases} a/m \\ b/m \end{cases} \text{ يعني } m = a \vee b$$

وإذا كان  $m'$  مضاعف مشترك ل  $a, b$  فإن  $m \leq m'$

$$b \vee a = a \vee b$$

$$a \vee a = |a|$$

إذا كان  $a/b$  فإن  $a \vee b = |b|$

### (2) خاصيات:

#### خاصية (1):

ليكن  $a, b$  من  $\mathbb{Z}^*$  و  $m = a \vee b$

مضاعفات  $m$  هي بالضبط المضاعفات المشتركة ل  $a, b$ .

$$\text{يعني: } \begin{cases} a/m' \\ b/m' \end{cases} \Leftrightarrow m = a \vee b/m'$$

#### برهان:

( $\Leftarrow$ ) نفترض أن  $a/m'$

ولدينا  $\begin{cases} a/m' \\ b/m' \end{cases}$  إذن  $\begin{cases} a/m \\ b/m \end{cases}$

( $\Rightarrow$ ) نفترض أن:  $a/m'$  و  $b/m'$  لنبين أن  $m/m'$

نعتبر قسمة  $m'$  على  $m$ . يعني:  $\begin{cases} m' = mq + r \\ 0 \leq r < m \end{cases}$

لنبين أن  $r = 0$

نفترض العكس. يعني  $r \neq 0$

إذن  $0 < r < m$

لدينا:  $r = m' - mq$

ولدينا  $\begin{cases} a/m \\ a/m' \end{cases}$  إذن  $a/m' - mq$  يعني  $a/r$

وبنفس الطريقة نجد  $b/r$

إذن  $r$  مضاعف مشترك ل  $a, b$ .

وجدنا أن  $r$  مضاعف مشترك ل  $a, b$  ويحقق  $0 < r < m$  وهذا

تناقض لأن  $a \vee b = m$

إذن  $r = 0$  ومنه  $m/m' = 1$ .

### ملاحظة:

$$|a| \vee |b| = |a \vee b| = a \vee b$$

### خاصية (2):

ليكن  $a, b$  من  $\mathbb{Z}^*$

لدينا:  $(a \wedge b).(a \vee b) = |ab|$

برهان:

$$\begin{cases} d = a \wedge b \\ m = a \vee b \end{cases} \text{ نضع}$$

$$\text{مع } \alpha \wedge \beta = 1 \begin{cases} a = \alpha d \\ b = \beta d \end{cases} \text{ نضع}$$

$$\begin{cases} m = \gamma a \\ m = \varphi b \end{cases} \text{ ونضع}$$

ولدينا:  $\gamma a = \varphi b$  يعني:  $\gamma \alpha d = \varphi \beta d$

نفترض العكس. يعني  $p$  يقبل قاسما فعليا أولي موجب  $p_0$ .

$$P = \{2, 3, 5, 7, \dots, q\}$$

ولدينا  $p_0$  أولي موجب إذن  $p_0 \in P$

إذن  $p_0$  هو أحد عوامل  $q!$  إذن  $p_0/q!$

$$p_0/p$$

$$\text{إذن } p_0/p - q!$$

$$\text{يعني } p_0/1$$

$$\text{يعني } p_0 = 1 \text{ أو } p_0 = -1$$

وهذا تناقض لأن  $p_0$  أولي.

إذن  $p$  أولي.

- وجدنا إذن  $p$  أولي و  $p > q$  وهذا تناقض لأن  $q$  هو أكبر عدد أولي.

بالتالي  $P$  غير مكبورة.

ومنه  $P$  غير منتهية.

### (3) طريقة عملية لتحديد الأعداد الأولية:

#### ملاحظة:

إذا كان  $p$  عدد أولي فإن  $-p$  أولي. وبالتالي يكفي البحث عن طرق لتحديد الأعداد الأولية الموجبة.

#### خاصية:

$$\text{ليكن } n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$$

$$\begin{cases} p/n \\ p^2 \leq n \end{cases} \text{ إذا كان } n \text{ غير أولي فإنه يوجد عدد أولي } p \text{ بحيث}$$

#### برهان

نفترض أن  $n$  غير أولي.

$$\text{لدينا } n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$$

ليكن  $p$  أصغر قاسم فعلي موجب ل  $n$ .

من خلال الخاصية (1) لدينا  $p$  أولي.

$$\text{إذن } p \text{ أولي و } p/n$$

$$\text{لنبين أن } p^2 \leq n$$

$$\text{لدينا: } p/n \text{ يعني } n = kp$$

لنبين أن  $k$  قاسم فعلي ل  $n$

$$\text{لدينا } k \neq 0$$

- نفترض أن  $k=1$  إذن  $n=p$  وهذا تناقض لأن:

$$n \text{ غير أولي و } p \text{ أولي.}$$

$$\text{إذن } k \neq 1$$

- نفترض أن  $k=n$  إذن  $p=1$  وهذا تناقض لأن  $p$  أولي.

$$\text{إذن } k \neq n$$

$$\text{- ولدينا } k > 0 \text{ إذن } k \neq \# \text{ و } k \neq -1$$

إذن  $k$  قاسم فعلي موجب ل  $n$ .

- وبما أن  $p$  هو أصغر قاسم فعلي موجب ل  $n$ .

$$\text{فإن: } p \leq k$$

$$\text{يعني: } p^2 \leq kp$$

$$\text{يعني } p^2 \leq n$$

$$\begin{cases} p/n \\ p^2 \leq n \end{cases} \text{ - إذن يوجد } p \text{ أولي بحيث:}$$

### أمثلة:

(\*)  $-1, 0, 1$  ليست أولية.

(\*)  $4$  ليس أولي لأن  $2$  قاسم فعلي ل  $4$ .

(\*)  $2, 3, 5, 7$  أعداد أولية.

### (2) خاصية (1):

#### خاصية (1):

ليكن  $a \in \mathbb{Z}^* - \{-1, 1\}$  غير أولي.

أصغر قاسم فعلي موجب ل  $a$  يكون أوليا.

#### برهان:

لتكن  $A$  مجموعة القواسم الفعلية الموجبة ل  $a$ .

- لدينا  $A \neq \emptyset$  (لأن  $a$  ليس أولي وبالتالي يقبل قاسم فعلي موجب)

- لدينا  $A$  مصغورة ب  $0$ .

$$A \subset \mathbb{N}$$

إذن  $A$  تقبل الأصغر عنصر. نضع  $p = \min A$

- لنبين أن  $p$  أولي:

لدينا  $p$  قاسم فعلي ل  $a$  إذن  $a \in \mathbb{Z}^* - \{-1, 1\}$  لأن  $p \neq 0$

لنبين أن  $p$  لا يقبل قاسما فعليا.

نفترض أن  $p$  يقبل قاسما فعليا  $p'$

$$\text{لدينا } \begin{cases} p'/p \\ p/a \end{cases} \text{ إذن } p'/a$$

- لدينا  $p'/p$  إذن  $|p'| \leq |p|$

$$\text{يعني: } |p'| \leq p$$

$$\text{ولدينا } \begin{cases} p' \neq p \\ p' \neq -p \end{cases} \text{ إذن } |p'| < p$$

ولدينا  $p/a$  إذن  $|p| < |a|$  أي  $p < |a|$

$$\text{إذن } |p'| < |a|$$

$$\text{إذن } |p'| \neq |a|$$

$$\text{ولدينا } |p'| \neq 1$$

إذن  $|p'|$  قاسم فعلي ل  $a$

$$\text{ولدينا } |p'| < p$$

وجدنا قاسما فعليا موجبا ل  $a$  ويحقق  $|p'| < p$

وهذا تناقض لأن  $p$  أصغر قاسم فعلي موجب.

ومنه  $p$  لا يقبل قاسما فعليا.

وبالتالي  $p$  أولي.

#### ملاحظة:

كل عدد  $a \in \mathbb{Z}^* - \{-1, 1\}$  غير أولي يقبل قاسم فعلي أولي موجب.

### خاصية (2):

مجموعة الأعداد الأولية غير منتهية.

#### برهان:

لتكن  $P$  مجموعة الأعداد الأولية الموجبة.

لنبين أن  $P$  غير مكبورة.

نفترض العكس. يعني  $P$  مكبورة.

- لدينا  $P \neq \emptyset$  (لأن  $2 \in P$ ).

$$P \subset \mathbb{N}$$

إذن  $P$  تقبل الأكبر عنصر. نضع:  $q = \max P$

$$\text{- نضع } p = q! + 1$$

لنبين أن  $p$  أولي:

**ملاحظة:**

1- ليكن  $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$

إذا أردنا أن نتحقق هل  $n$  أولي، نتبع ما يلي:

+ نعتبر الأعداد الأولية  $p$  التي تحقق  $p^2 \leq n$

- إذا كان أحد هذه الأعداد يقسم  $n$  فإن  $n$  غير أولي لأنه يقبل قاسما فعليا.

- إذا كانت جميع هذه الأعداد لا تقسم  $n$  فإن  $n$  أولي.

**مثال:**

- لنحدد جميع الأعداد الأولية أصغر من 100.

بالنسبة للأعداد الأصغر من 100، الأعداد الأولية  $p$  التي يمكن أن تحقق  $p^2 \leq n$  هي 2, 3, 5, 7.

إذن الأعداد الأولية الأصغر من 100 هي الأعداد التي لا تقبل القسمة على 2, 3, 5, 7 إضافة إلى الأعداد 2, 3, 5, 7.

- إذن هذه الأعداد هي:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

2- ليكن  $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$

لكي نتحقق هل  $n$  أولي يمكن اتباع الخوارزمية التالية.

نقوم بقسمة  $n$  على الأعداد الأولية  $p$  انطلاقا من 2 على التوالي، ونقف عند إحدى الحالات:

- إذا أصبح الخارج  $q$  أصغر من  $p$  قطعاً، والباقي غير منعدم فيكون في هذه الحالة العدد  $n$  أولي.

- إذا حصلنا على باقي منعدم. فيكون  $n$  غير أولي.

**برهان:**

(\* إذا حصلنا على باقي منعدم فإن  $n$  يقبل قاسما فعليا. إذن  $n$  غير أولي.

(\* نفتر أن حصلنا على  $q < p$  قبل  $r = 0$

لدينا  $0 \leq r < p$   $n = qp + r$

لدينا:  $q < p \Rightarrow q + 1 \leq p$

$\Rightarrow pq + p \leq p^2$

ولدينا  $r < p$

إذن  $pq + r < p + pq \leq p^2$

إذن  $pq + r \leq p^2$  يعني  $n \leq p^2$

إذن أجرينا قسمة  $n$  على  $p$  ولم نحصل على باقي منعدم حتى أصبح  $p^2 \geq n$  هذا يعني أن  $n$  لا يقبل على أي عدد أولي  $p$  يحقق  $p^2 \leq n$ . إذن  $n$  أولي.

**مثال:**

لنتحقق هل 179 أولي:

$p$	2	3	5	7	11	13	17
$q$	89	59	35	25	16	13	10
$r$	1	2	4	4	3	10	9

إذن 179 أولي.

**(4) الأعداد الأولية وقابلية القسمة:**

**خاصية (1):**

ليكن  $a \in \mathbb{Z}^*$  و  $p$  أولي.

$$p \wedge a = 1 \Leftrightarrow p \times a$$

**برهان:**

( $\Rightarrow$ ) نفترض أن  $p \wedge a = 1$  ولنبين أن  $p \times a$

- نفترض  $p/a$

إذن  $p \wedge a = |p|$  إذن  $|p| = 1$

يعني  $p = 1$  أو  $p = -1$

وهذا تناقض لأن  $p$  أولي.

إذن  $p \times a$

( $\Leftarrow$ ) نفترض أن  $p \times a = 1$  لنبين أن  $p \wedge a = 1$

نضع  $d = p \wedge a$

إذن  $\begin{cases} d/p \\ d/a \end{cases}$  ونعلم أن قواسم  $p$  هي:  $-1, 1, -p, p$

ولدينا  $\begin{cases} p \times a \\ -p \times a \end{cases}$  إذن  $d \neq -p$  و  $d \neq p$

ولدينا  $d \neq -1$  لأن  $d > 0$

إذن  $d = 1$  ومنه  $p \wedge a = 1$

**خاصية (2):**

ليكن  $p, q$  أوليين:

$$p \wedge q = 1 \Leftrightarrow |p| \neq |q|$$

**برهان:**

$$p \wedge q = 1 \Leftrightarrow p \times q$$

$$\Leftrightarrow p \notin \{1, -1, q, -q\}$$

$$\Leftrightarrow p \notin \{q, -q\}$$

$$\Leftrightarrow p \neq q$$
 و  $p \neq -q$

$$\Leftrightarrow |p| \neq |q|$$

**خاصية (3):**

ليكن  $a_1, a_2, \dots, a_n$  من  $\mathbb{Z}$  و  $p$  أولي.

$$p/a_1 a_2 \dots a_n \Rightarrow (\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}) p/a_i$$

**برهان:**

نفترض أن  $p/a_1 a_2 \dots a_n$ . لنبين أن:  $p/a_i$   $\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}$

\* إذا كان أحد الأعداد  $a_i$  منعدم.

مثلا  $a_{i_0} = 0$  فإن  $p/a_{i_0}$

\* إذا كانت جميع الأعداد  $a_i$  تخالف 0.

نفترض أن:  $p \times a_i$  ( $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$ )

يعني  $p \wedge a_i = 1$

$$\text{إذن } p \wedge \prod_{i=1}^n a_i = 1 \text{ يعني } p \times \prod_{i=1}^n a_i$$

وهذا تناقض.

إذن  $p/a_i$  ( $\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ).

**ملاحظة:**

1- ليكن  $a \in \mathbb{Z}$  و  $p$  أولي و  $n \in \mathbb{N}$ .

$$p/a^n \Rightarrow p/a$$
 (\*)

$$p/ab \Rightarrow p/a \text{ أو } p/b$$
 (\*)

2- ليكن  $p$  أولي موجب.

$$(\forall 1 \leq k < p) : p \wedge k = 1$$
 (\*)

$$(\forall k \in \mathbb{Z}/1 \leq |k| < p) : p \wedge k = 1$$
 (\*)

**خاصية (4):**

ليكن  $p, p_1, p_2, \dots, p_n$  أعداد أولية.

$$p/p_1 p_2 \dots p_n \Rightarrow (\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}) |p| = |p_i|$$

**برهان:**

بالتالي:  $(a+1)^p \equiv a^p + 1[p]$

(4)  $a \equiv n[p]$  ليكن  $n \in \mathbb{N}$  لنبين أن  $n^p \equiv n[p]$

نعلم أن:

ليكن  $n \in \mathbb{N}^*$   $(\forall a \in \mathbb{N}) (a+1)^p \equiv a^p + 1[p]$

إذن  $1^p \equiv 1[p]$

$2^p \equiv 1^p + 1[p]$

$3^p \equiv 2^p + 1[p]$

$n^p \equiv (n-1)^p + 1[p]$

بجمع أطراف المتساويات طرف طرف نستنتج أن:

$n^p \equiv 1 + \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ مرة}}[p]$

مرة  $n$

يعني:  $n^p \equiv n[p]$

ونلاحظ أن الخاصية تبقى صحيحة من أجل  $n=0$

إذن:  $(\forall n \in \mathbb{N}) n^p \equiv n[p]$

(b) ليكن  $n \in \mathbb{N}$  بحيث  $n \wedge p = 1$ . لنبين أن:  $n^{p-1} \equiv 1[p]$

لدينا مما سبق:  $n^p \equiv n[p]$

يعني  $p/n^p - n$

يعني  $p/n(n^{p-1} - 1)$

وبما أن  $n \wedge p = 1$

فإن  $p/n^{p-1} - 1$

يعني  $[p] \equiv 1$  لكل  $n$  بحيث  $n \wedge p = 1$

(4)  $a \in \mathbb{Z}$  ليكن  $a \in \mathbb{Z}$ . لنبين أن  $a^p \equiv a[p]$

← إذا كان  $a \geq 0$

فإنه من خلال ما سبق:  $a^p \equiv a[p]$

← إذا كان  $a \leq -1$

فإن  $-a \geq 1$  إذن  $(-a)^p \equiv -a[p]$

- إذا كان  $p \neq 2$  فإن  $p$  فردي.

إذن:  $(-a)^p = -a^p$

إذن  $-a^p \equiv -a[p]$

إذن  $a^p \equiv a[p]$

- إذا كان  $p = 2$  فإن:  $(-a)^2 \equiv -a[2]$

يعني:  $a^2 \equiv -a[2]$

ولدينا  $-a \equiv a[2]$

إذن  $a^2 \equiv a[2]$

إذن:

$(\forall a \in \mathbb{Z}) a^p \equiv a[p]$

(b) ليكن  $a \in \mathbb{Z}$  بحيث  $a \wedge p = 1$ . لنبين أن  $a^{p-1} \equiv 1[p]$

لدينا:  $a^p \equiv a[p]$

يعني  $p/a^p - a$

أي  $p/a^{p-1} - 1$

وبما أن  $a \wedge p = 1$  فإن  $p/a^{p-1} - 1$

إذن  $a^{p-1} \equiv 1[p]$

لدينا:  $p/p_1 p_2 \dots p_n$

إذن يوجد  $i$  بحيث  $p/p_i$

ونعلم أن قواسم  $p_i$  هي:  $-1, 1, -p_i, p_i$

ولدينا  $p \neq 1$  و  $p_i \neq 1$  إذن  $p_i = p$  أو  $-p_i = p$

يعني  $|p| = |p_i|$

**ملاحظة:**

(\*)  $p/p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n} \Rightarrow (\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}) |p| = |p_i|$

(\*) إذا كانت الأعداد  $p_i$  موجبة

فإن:  $p/p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n} \Rightarrow (\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}) p = p_i$

**تطبيق:**

ليكن  $p$  عدد أولي موجب.

(1) بين أن  $p/C_p^k$  لكل  $1 \leq k \leq p-1$

(2) بين أن  $(\forall a \in \mathbb{N}) (a+1)^p \equiv a^p + 1[p]$

(3) بين أن:  $(\forall n \in \mathbb{N}) n^p \equiv n[p]$

(b) استنتج أن:  $n^{p-1} \equiv 1[p]$  لكل  $n$  من  $\mathbb{N}$  بحيث  $n \wedge p = 1$

(4) بين أن  $(\forall a \in \mathbb{Z}) a^p \equiv a[p]$

(b) بين أن  $a^{p-1} \equiv 1[p]$  لكل  $a$  من  $\mathbb{Z}$  بحيث  $a \wedge p = 1$

(1) لنبين أن  $p/C_p^k$  لكل  $1 \leq k \leq p-1$

ليكن  $1 \leq k \leq p-1$ . لنبين أن  $p/C_p^k$

لدينا:

$$C_p^k = \frac{p!}{k!(p-k)!} = \frac{1.2 \dots (p-k)(p-k+1) \dots p}{k!(1.2 \dots (p-k))}$$

$$= \frac{(p-k+1) \dots p}{k!}$$

إذن  $k!C_p^k = (p-k+1) \dots p$

إذن  $p/k!C_p^k$

ولدينا:  $\forall i \in \{1, 2, \dots, k\} 1 \leq i < p$

إذن  $p \times i$

إذن  $p \wedge i = 1$

إذن  $p \wedge k! = 1$  حسب Gauss:

لدينا  $p/C_p^k$  ( $\forall 1 \leq k \leq p-1$ )

(2) ليكن  $a \in \mathbb{N}$ . لنبين أن:  $(a+1)^p \equiv a^p + 1[p]$

لدينا:

$$(a+1)^p - (a^p + 1) = \sum_{k=0}^p a^k \cdot 1^{p-k} - (a^p + 1)$$

$$= \sum_{k=0}^p C_p^k a^k - (a^p + 1)$$

$$= 1 + a^p + \sum_{k=1}^{p-1} C_p^k a^k - (a^p + 1)$$

$$= \sum_{k=1}^{p-1} C_p^k a^k$$

ولدينا  $p/C_p^k$   $1 \leq k \leq p-1$

إذن  $p/C_p^k a^k$

إذن  $p/\sum_{k=1}^{p-1} C_p^k a^k$

يعني:  $p/(a+1)^p - (a^p + 1)$

$$2^0.3^0 = 1 \quad ; \quad 2^0.3^1 = 3 \quad ; \quad 2^0.3^2 = 9$$

$$2^0.3^3 = 27 \quad ; \quad 2^1.3^0 = 2 \quad ; \quad 2^1.3^1 = 6$$

$$2^1.3^2 = 18 \quad ; \quad 2^1.3^3 = 54.$$

← القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر:

ليكن  $p_1, p_2, \dots, p_r$  الأعداد الأولية التي تظهر في تفكيك  $b$  و  $a$  نضع:  $a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$  حيث  $0 \leq \alpha_i$

و  $b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \dots p_r^{\beta_r}$  و  $0 \leq \beta_i$  حيث  $0 = \alpha_i$  إذا كان  $p_i$  لا يظهر في تفكيك  $a$ .  
و  $0 = \beta_i$  إذا كان  $p_i$  لا يظهر في تفكيك  $b$ .  
نضع  $d = p_1^{\gamma_1} \cdot p_2^{\gamma_2} \dots p_r^{\gamma_r}$  حيث:  $\gamma_i = \inf(\alpha_i, \beta_i)$

لنبين أن  $d = a \wedge b$   
\* لدينا:  $\forall i \in \{1, 2, \dots, r\} \gamma_i \leq \alpha_i$  و  $\gamma_i \leq \beta_i$

إذن  $\left\{ \begin{array}{l} d/a \\ d/b \end{array} \right.$  إذن لا قاسم مشترك ل  $b$  و  $a$

\* ليكن  $d'$  قاسم مشترك ل  $b$  و  $a$ . لنبين أن  $d' \leq d$

لدينا:  $d' = p_1^{\lambda_1} \cdot p_2^{\lambda_2} \dots p_r^{\lambda_r}$  إذن  $d'$  يكتب على شكل:  $\left\{ \begin{array}{l} d'/a \\ d'/b \end{array} \right.$

حيث  $0 \leq \lambda_i \leq \alpha_i$   
 $0 \leq \lambda_i \leq \beta_i$

إذن  $0 \leq \lambda_i \leq \inf(\alpha_i, \beta_i)$

إذن  $0 \leq \lambda_i \leq \gamma_i$

إذن  $d'/d$

إذن  $d = a \wedge b$

← بنفس الطريقة نجد المضاعف المشترك الأصغر.

### خاصية:

ليكن  $a$  و  $b$  من  $\mathbb{N}^* - \{1\}$

نضع  $a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$

و  $b = p_1^{\beta_1} \cdot p_2^{\beta_2} \dots p_r^{\beta_r}$

حيث  $p_i$  هي الأعداد الأولية التي تظهر في تفكيك  $a$  أو  $b$

$\alpha_i = 0$  إذا كان  $p_i$  لا يظهر في تفكيك  $a$

$\beta_i = 0$  إذا كان  $p_i$  لا يظهر في تفكيك  $b$

لدينا:  $a \wedge b = \prod_{i=1}^r p_i^{\inf(\alpha_i, \beta_i)}$

و  $a \vee b = \prod_{i=1}^r p_i^{\sup(\alpha_i, \beta_i)}$

### ملاحظة:

(\* القاسم المشترك الأكبر ل  $b$  و  $a$  هو جداء العوامل الأولية المشتركة مرفوعة إلى أصغر أس.

(\*  $a \vee b$  هو جداء العوامل الأولية المشتركة وغير المشتركة مرفوعة إلى أكبر أس.

### مثال:

لنحدد:  $76 \vee 632$  و  $76 \wedge 632$

76	2	632	2
38	2	316	2
19	19	158	2
1		79	79
		1	

إذن  $76 = 2^2 \cdot 19$

إذن  $632 = 2^3 \cdot 79$

$$76 \wedge 632 = 2^2 = 4$$

لدينا:

### ميرھنة Fermat

ليكن  $p$  أولي موجب.

$$\forall a \in \mathbb{Z} \quad a^p \equiv a [p] \quad (*)$$

$$a \wedge p = 1 / \mathbb{Z} \quad \text{لكل } a \quad a^{p-1} \equiv 1 [p] \quad (*)$$

(5) تفكيك عدد إلى عداد عوامل أولية:

### (a) ميرھنة:

كل عدد  $a$  من  $\mathbb{Z}^* - \{-1, 1\}$  يكتب بطريقة وحيدة على شكل

$$a = \varepsilon p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$$

حيث:

(\* الأعداد  $p_i$  أولية موجبة ومختلفة مثلى مثلى.

(\* الأعداد  $\alpha_i$  طبيعية غير منعدمة.

(\*  $\varepsilon = 1$  إذا كان  $a > 0$

(\*  $\varepsilon = -1$  إذا كان  $a < 0$

### (b) تطبيقات:

← قابلية القسمة:

### خاصية:

ليكن  $b$  و  $a$  من  $\mathbb{N}^* - \{1\}$

ليكن:  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$  تفكيك  $a$  إلى جداد عوامل أولية.

$b/a$  إذا فقط إذا كان  $b$  يكتب على شكل:

$$b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_r^{\beta_r}$$

حيث:  $\beta_i \in \{0, 1, 2, \dots, \alpha_i\} = E_i$

كل ترتيبية  $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$  من  $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_r$  تعطينا قاسم

موجب ل  $a$  هو:  $b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_r^{\beta_r}$

إذن عدد القواسم الموجبة ل  $a$  هو عدد الترتيبات  $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$

ونعلم أن عدد هذه الترتيبات هو:  $\text{card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_r)$

$$= (\text{card}E_1)(\text{card}E_2) \times \dots (\text{card}E_r)$$

$$= (1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \dots (1 + \alpha_r)$$

### خاصية:

ليكن  $a$  من  $\mathbb{N}^* - \{1\}$  و  $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$  تفكيك  $a$  إلى جداد

عوامل أولية.

عدد القواسم الموجبة ل  $a$  هو:  $\alpha = \prod_{i=1}^r (1 + \alpha_i)$

### مثال:

لنحدد القواسم الموجبة للعدد 54:

لنفكك 54:

54	2
27	3
9	3
3	3
1	

إذن  $54 = 2 \times 3^3$

← عدد القواسم الموجبة ل 54 هو:

$$\alpha = (1+1)(1+3) = 8$$

وهذه القواسم هي الأعداد التي تكتب على شكل:

$$\beta_1 \in \{0, 1\} \quad \text{حيث } d = 2^{\beta_1} \cdot 3^{\beta_2}$$

$$\beta_2 \in \{0, 1, 2, 3\} \quad \text{و}$$

إذن هذه القواسم هي:

$$0 \leq r_1 < b \quad q_0 = bq_1 + r_1$$

(\* إذا كان  $q_1 \neq 0$ : نقسم  $q_1$  على  $b$ :

$$0 \leq r_2 < b \quad q_1 = bq_2 + r_2$$

وهكذا نتابع القسومات حتى نحصل على خارج منعدم. ومن الضروري أن نحصل على خارج منعدم، لأن:

$$1 < b \Rightarrow q_0 < q_0 b < q_0 b + r_0 = n \quad \text{لدينا:}$$

$$q_0 < n \quad \text{إذن}$$

$$1 < b \Rightarrow q_1 < q_1 b < q_1 b + r_1 = q_0 \quad \text{إذن}$$

$$q_1 < q_0$$

$$\text{إذن } 0 < \dots < q_2 < q_1 < q_0 < n$$

هذه الخوارج تناقصية قطعاً. وبالتالي ضروري أن نحصل على خارج منعدم.

- نفترض أن  $q_p$  هو أول خارج منعدم.

$$\forall i \in \{0, \dots, (p-1)\} \quad q_i \neq 0 \quad \text{يعني:}$$

$$0 \leq r_0 < b \quad n = q_0 b + r_0 \quad (b^0)$$

$$0 \leq r_1 < b \quad q_0 = q_1 b + r_1 \quad (b^1)$$

$$0 \leq r_2 < b \quad q_1 = q_2 b + r_2 \quad (b^2)$$

$$q_{p-1} = b \cdot q_p + r_p \quad (b^p)$$

بضرب الأسطر في  $b^0, b^1, b^2, \dots, b^p$  على التوالي نحصل على وجمع أطراف المتساويات نحصل على:

$$n = r_0 + r_1 b + r_2 b^2 + \dots + r_p b^p + q_p b^{p+1} \quad (q_p = 0)$$

$$0 =$$

$$n = r_p b^p + r_{p-1} b^{p-1} + \dots + r_1 b + r_0 \quad \text{إذن:}$$

$$0 \leq r_i < b \quad \text{حيث}$$

$$r_p = q_{p-1} \neq 0 \quad \text{و}$$

$$n = r_p r_{p-1} \dots r_0 (b) \quad \text{إذن}$$

### خاصية:

$$b \in \mathbb{N}^* - \{1\} \text{ و } a \in \mathbb{N}^*$$

نقوم بالقسومات المتتالية للخوارج على  $b$  بدءاً من  $n$ .

وإذا كانت  $r_0, r_1, \dots, r_p$  هي بواقي هذه القسومات حيث  $r_p$  هو باقي أول قسمة نحصل فيها على خارج منعدم

$$n = r_p r_{p-1} \dots r_0 (b) \quad \text{فإن:}$$

ونلخص هذه القسومات في الجدول التالي:

$$\begin{array}{r} n \mid b \\ \hline q_0 \mid b \\ \hline q_1 \mid b \\ \hline q_2 \mid b \\ \hline \dots \\ \hline 0 = q_p \end{array}$$

### مثال:

$$n = 798 \quad \text{نعتبر العدد}$$

لنمثل  $n$  في أنظمة العد ذات الأساس 7.

$$\begin{array}{r} 798 \mid 7 \\ \hline 114 \mid 7 \\ \hline 16 \mid 7 \\ \hline 2 \mid 7 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$76 \vee 632 = 2^3 \cdot 19 \cdot 79 = 12008$$

## (VII) نظمات العد:

### 1- أمثلة:

**مثال 1:** نعتبر العدد  $n = 526$

$$n = 526 = 500 + 20 + 6$$

$$= 510^2 + 210^1 + 6$$

(\* لدينا:

إذن العدد  $n$  يكتب باستعمال العشرة أرقام 0, 1, 2, ..., 9 وقوى 10.

نقول إن الكتابة  $n = 256$  تمثيل عشري للعدد  $n$  أو تمثيل  $n$  في أنظمة العد العشري، أو تمثيل العدد  $n$  في أنظمة العد ذات الأساس 10.

(\* ويمكن كتابة  $n$  باستعمال 3 أرقام فقط 0, 1, 2 وقوى 3:

$$n = 526 = 486 + 40$$

$$= 2 \cdot 3^5 + 27 + 13$$

$$= 2 \cdot 3^5 + 3^3 + 9 + 4$$

$$= 2 \cdot 3^5 + 3^3 + 3^2 + 3 + 1$$

$$\text{إذن } n = 2 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3 + 1$$

$$n = 201111_{(3)} \quad \text{ونكتب:}$$

وهذه الكتابة تسمى تمثيل  $n$  في أنظمة العد ذات الأساس 3.

**مثال 2:** نعتبر العدد  $n = 200$

- لنكتب تمثيل  $n$  في أنظمة العد ذات الأساس 3.

$$n = 200 = 162 + 38$$

$$= 2 \cdot 3^4 + 27 + 11$$

$$= 2 \cdot 3^4 + 3^3 + 3^2 + 2$$

$$= 2 \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3 + 2$$

$$n = 21102_{(3)} \quad \text{إذن:}$$

2- تعميل عدد طبيعي في أنظمة العد ذات الأساس  $b$

### ميرهنة:

$$\text{ليكن } b \in \mathbb{N}^* - \{1\}$$

كل عدد  $n$  من  $\mathbb{N}^*$  يكتب بطريقة وحيدة على شكل:

$$n = \alpha_p b^p + \alpha_{p-1} b^{p-1} + \alpha_{p-2} b^{p-2} + \dots + \alpha_1 b^1 + \alpha_0$$

حيث:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_i \in \mathbb{N} \\ 0 \leq \alpha_i < b \end{array} \right. \quad \forall i \in \{0, 1, 2, \dots, p\} \text{ و } \alpha_p \neq 0$$

$$\text{و } b^p \leq n < b^{p+1}$$

$$n = \alpha_p \alpha_{p-1} \dots \alpha_1 \alpha_0 (b) \quad \text{ونكتب:}$$

وتسمى هذه الكتابة تمثيل العدد  $n$  في أنظمة العد ذات الأساس 5.

### ملاحظة:

هناك عدة نظمات العد أهمها:

- أنظمة العد العشري وهي النظام المتداول.

- أنظمة العد الثنائي والأرقام المستعملة هي 0, 1.

- أنظمة العد ذات الأساس 8. والأرقام المستعملة هي: 0, 1, ..., 7.

- أنظمة العد ذات الأساس 12. والأرقام المستعملة 0, 1, ..., 9,  $\beta, \alpha$ .

### 3- طريقة عملية لتمثيل عدد $n$ في أنظمة عد أساسها $b$ .

$$\text{ليكن } b \in \mathbb{N}^* - \{1\} \text{ و } n \in \mathbb{N}^*$$

$$n = bq_0 + r_0 \quad \text{مع } 0 \leq r_0 < b$$

$$n \text{ نقسم على } b: \text{ إذا كان } q_0 \neq 0: \text{ نقسم } q_0 \text{ على } b:$$



$$\sum_{i=1}^p -\alpha_i 10^i + \alpha_0 \equiv \alpha_0 [2] \quad \text{يعني:}$$

$$x \equiv \alpha_0 [2] \quad \text{يعني:}$$

إذن:

$$2/x \Leftrightarrow x \equiv 0 [2]$$

$$\Leftrightarrow \alpha_0 \equiv 0 [2] \quad (x \equiv \alpha_0 [2])$$

$$\Leftrightarrow 2/\alpha_0$$

وبالتالي:

(\* لنبين أن:

$$3/x \Leftrightarrow 3 \left/ \sum_{i=0}^p \alpha_i \right.$$

لدينا  $10 \equiv 1 [3]$

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, p\} \quad 10^i \equiv 1 [3] \quad \text{إذن}$$

$$\alpha_i 10^i \equiv \alpha_i [3] \quad \text{يعني}$$

إذن:

$$\sum_{i=1}^p \alpha_i 10^i \equiv \sum_{i=1}^p \alpha_i [3]$$

$$\sum_{i=1}^p \alpha_i 10^i + \alpha_0 \equiv \sum_{i=1}^p \alpha_i [3] \quad \text{إذن:}$$

$$x \equiv \sum_{i=0}^p \alpha_i [3] \quad \text{أي:}$$

إذن:

$$3/x \Leftrightarrow x \equiv 0 [3]$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=0}^p \alpha_i \equiv 0 [3] \quad \left( x \equiv \sum_{i=0}^p \alpha_i [3] \right)$$

$$\Leftrightarrow 3 \left/ \sum_{i=0}^p \alpha_i \right.$$

$$3/x \Leftrightarrow 3 \left/ \sum_{i=0}^p \alpha_i \right. \quad \text{وبالتالي:}$$

$$4/x \Leftrightarrow 4/\overline{\alpha_1 \alpha_0} \quad \text{- لنبين أن:}$$

$$\forall i \in \{2, \dots, p\} : 10^i = 10^2 \cdot 10^{i-2} \quad \text{لدينا:}$$

$$= 100 \cdot 10^{i-2}$$

$$= 4.25 \cdot 10^{i-2}$$

$$\forall i \in \{2, \dots, p\} \quad 10^2 \equiv 0 [4] \quad \text{إذن}$$

$$\alpha_i 10^i \equiv 0 [4] \quad \text{إذن}$$

$$\sum_{i=2}^p \alpha_i \cdot 10^i \equiv 0 [4] \quad \text{إذن:}$$

إذن

$$\sum_{i=2}^p \alpha_i 10^i + \alpha_1 10 + \alpha_0 \equiv \alpha_1 10 + \alpha_0 [4]$$

$$x \equiv \alpha_1 \cdot 10 + \alpha_0 [4] \quad \text{يعني:}$$

$$x \equiv \overline{\alpha_1 \alpha_0} [4] \quad \text{يعني}$$

$$4/x \Leftrightarrow x \equiv 0 [4] \quad \text{إذن:}$$

$$\Leftrightarrow \overline{\alpha_1 \alpha_0} \equiv 0 [4] \quad (x \equiv \overline{\alpha_1 \alpha_0} [4])$$

$$\Leftrightarrow 4/\overline{\alpha_1 \alpha_0}$$

$$4/x \Leftrightarrow 4/\overline{\alpha_1 \alpha_0} \quad \text{وبالتالي:}$$

$$799 = \overline{2220}_{(7)} \quad \text{إذن:}$$

#### (4) تغيير الأساسية:

(\* إذا أردنا المرور من التمثيل العشري إلى نظمة عد أساسها  $b$  نتبع الخوارزمية السابقة.

(\* إذا أردنا المرور من التمثيل في نظمة عد أساسها  $b$  إلى نظمة

$$\text{العد العشري، نستعمل: } n = \overline{d_p d_{p-1} \dots d_0}_{(b)}$$

$$= \alpha_p b^p + \alpha_{p-1} b^{p-1} \dots + \alpha_1 b + \alpha_0$$

**مثال:**

$$n = \overline{3450}_{(6)} = 3 \cdot 6^3 + 4 \cdot 6^2 + 5 \cdot 6 + 0$$

$$= 822$$

(\* إذا أردنا المرور من التمثيل في نظمة عد أساسها  $b$  إلى نظمة عد أساسها  $b'$ ، نمر من  $b$  إلى التمثيل العشري ومن التمثيل العشري إلى  $b'$ .

#### (5) مقارنة عددين:

**خاصية:**

$$x = \overline{\alpha_p \alpha_{p-1} \dots \alpha_0}_{(b)} \quad \text{نعتبر العددين:}$$

$$y = \overline{\beta_q \beta_{q-1} \dots \beta_0}_{(b)}$$

إذا كان  $p > q$  يعني عدد أرقام  $x$  أكبر قطعاً من عدد أرقام  $y$ . فإن  $x > y$ .

#### **خاصية 2:**

نعتبر العددين:

$$x = \overline{\alpha_p \dots \alpha_0}_{(b)}$$

$$y = \overline{\beta_p \dots \beta_0}_{(b)}$$

(  $x$  و  $y$  لهما نفس عدد الأرقام )

$$\text{نفترض أن } \alpha_i \neq \beta_i, \dots, \alpha_{p-1} = \beta_{p-1}, \alpha_p = \beta_p$$

- إذا كان  $\alpha_i > \beta_i$  فإن  $x > y$

- إذا كان  $\alpha_i < \beta_i$  فإن  $x < y$

#### (6) الجمع والضرب في نظمة عد أساسها $b$ .

عمليتا الجمع والضرب في نظمة عد أساسها  $b$  تتم بنفس الطريقة في نظمة العد العشري.

هناك فرق فقط في الاحتفاظ، حيث عند حساب  $\alpha_i \beta_i$  أو  $\alpha_i + \beta_i$  إذا حصلنا على رقم  $\gamma < b$  نكتب  $\gamma$ . وإذا حصلنا على  $\gamma \geq b$  نقوم

$$\text{بقسمة } \gamma \text{ على } b = bq + r \text{ مع } 0 \leq r < b$$

نكتب  $r$  ونحتفظ ب  $q$ .

**مثال:**

$$3675_{(8)} + 2764_{(8)} = 6661_{(8)} \quad (*)$$

$$5624_{(7)} \times 56_{(7)} = 50313_{(7)} + 41356_{(7)} = 464203_{(7)} \quad (*)$$

(7 مضاعف القسمة على 2, 3, 4, 5, 9, 11, 25.

$$\text{نعتبر العدد } x = \overline{\alpha_p \alpha_{p-1} \dots \alpha_0}_{(10)}$$

$$\text{لدينا: } x = \alpha_p 10^p + \alpha_{p-1} 10^{p-1} + \dots + \alpha_1 10 + \alpha_0$$

$$2/x \Leftrightarrow 2/\alpha_0 \quad \text{لنبين أن:}$$

$$\forall i \in \{1, \dots, p\} \quad 10^i \equiv 0 [2] \quad \text{إذن}$$

$$\alpha_i 10^i \equiv 0 [2] \quad \text{يعني}$$

$$\sum_{i=1}^p \alpha_i 10^i \equiv 0 [2] \quad \text{إذن:}$$

وبالتعويض في (1) نحصل على:

$$5(265a + 2c) = 271.5$$

$$265a + 2c = 271 \quad \text{يعني}$$

$$(*) \quad 2c = 271 - 265a \quad \text{يعني}$$

ولدينا  $2c > 0$  إذن  $271 - 265a > 0$

$$0 < a < \frac{271}{265} = 1 \quad \text{يعني:}$$

إذن:  $a = 1$

وبالتعويض في (\*) نجد:  $c = 3$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 5 \\ c = 3 \end{cases} \quad \text{بالتالي:}$$

- لنبين أن:  $11/x \Leftrightarrow \alpha_0 + \alpha_1 + \dots \equiv \alpha_1 + \alpha_3 + \dots [11]$

لدينا:  $\forall i \in \{1, \dots, p\} \quad 10 \equiv -1 [11]$

إذن  $10^i \equiv (-1)^i [11]$

إذن  $\alpha_i 10^i \equiv \alpha_i (-1)^i [11]$

إذن:  $\sum_{i=1}^p \alpha_i 10^i \equiv \sum_{i=1}^p \alpha_i (-1)^i [11]$

أي:  $\sum_{i=1}^p \alpha_i 10^i + \alpha_0 \equiv \sum_{i=1}^p \alpha_i (-1)^i + \alpha_0 [11]$

يعني:  $x \equiv \sum_{i=1}^p \alpha_i (-1)^i [11]$

يعني:  $x \equiv \sum_{i=0}^p \alpha_i (-1)^i + \sum_{i=0}^p \alpha_i (-1)^i [11]$

إذن:  $x \equiv \sum_{i=0}^p \alpha_i - \sum_{i=0}^p \alpha_i [11]$

إذن:  $11/x \Leftrightarrow x \equiv 0 [11]$

$\Leftrightarrow \sum_{i=0}^p \alpha_i - \sum_{i=0}^p \alpha_i \equiv 0 [11]$

$\Leftrightarrow \sum_{i=0}^p \alpha_i \equiv \sum_{i=0}^p \alpha_i [11]$

بالتالي:  $11/x \Leftrightarrow \alpha_0 + \alpha_2 + \dots = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots [11]$

### خاصية:

نعتبر العدد  $x = \overline{\alpha_p \alpha_{p-1} \dots \alpha_0}_{(10)}$

لدينا:  $*) 2/x \Leftrightarrow \overline{2\alpha_0}_{(10)}$

$*) 3/x \Leftrightarrow 3 \overline{\sum_{i=0}^p \alpha_i}$

$*) 4/x \Leftrightarrow 4 \overline{\alpha_1 \alpha_0}$

$*) 5/x \Leftrightarrow \alpha_0 \in \{0, 5\}$

$*) 9/x \Leftrightarrow 9 \overline{\sum_{i=0}^p \alpha_i}$

$*) 11/x \Leftrightarrow \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_4 + \dots \equiv \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_5 + \dots [11]$

$*) 25/x \Leftrightarrow \overline{\alpha_1 \alpha_0} \in \{00, 25, 50, 75\}$

### تمرين تطبيقي:

حدد الأعداد الطبيعية غير المنعدمة  $c, b, a$  بحيث:

$$\overline{bbac}_{(7)} = \overline{abca}_{(11)}$$

نلاحظ أن  $c, b, a$  أصغر قطعا من 11 و 7.

وبالتالي فهي محصورة قطعا بين 0 و 7.

وبالتالي فهي محصورة بين 1 و 6.

لدينا:

$$\begin{aligned} \overline{bbac}_{(7)} = \overline{abca}_{(11)} &\Leftrightarrow b7^3 + b7^2 + a7 + c = a11^3 + b11^2 + c11 + a \\ &\Leftrightarrow 343b + 49b + 7a + c = 1331a + 121b + 11c + a \\ &\Leftrightarrow 1325a - 271b + 10c = 0 \\ &\Leftrightarrow 1325a + 10c = 271b \\ &\Leftrightarrow 5(265a + 2c) = 271b \quad (1) \end{aligned}$$

إذن  $5/271b$

ولدينا:  $271 \wedge 5 = 1$  إذن حسب Gauss نستنتج أن  $5/b$

وبما أن  $1 \leq b \leq 6$  فإن  $b = 5$