

المرجح القدرات المنتظرة

- استعمال المرجح في تبسيط تعبير متوجه;
- إنشاء مرجح n نقطه ($2 \leq n \leq 4$):
- استعمال المرجح لإثبات استقامية ثلاثة نقط من المستوى;
- استعمال المرجح في إثبات تقاطع المستقيمات;
- استعمال المرجح في حل مسائل هندسية وفيزيائية.

I- مرجح نقطتين 1- النقطة متزنة تعريف

لتكن A نقطة من المستوى و α عدداً حقيقياً
ال الزوج $(A; \alpha)$ يسمى نقطة متزنة. نقول كذلك النقطة A معينة بالمعامل α . أو العدد α وزن النقطة A .

2- مرجح نقطتين أشنطة

(I) لتكن A و B نقطتين مختلفتين

1- بين أنه توجد نقطة وحيدة G حيث $\vec{GA} - 4\vec{GB} = \vec{0}$ ثم أنشئها

2- بين أنه توجد نقطة وحيدة G حيث $\vec{0} = 2\vec{GA} + 3\vec{GB}$ ثم أنشئها

(II) لتكن A و B نقطتين مختلفتين و α و β عددين حقيقيين غير منعدمين

1- بين اذا كان $\alpha + \beta \neq 0$ فان توجد نقطة وحيدة G حيث $\vec{\alpha}\vec{GA} + \vec{\beta}\vec{GB} = \vec{0}$

2- إذا كان $\alpha + \beta = 0$ فانه لا توجد أية نقطة G حيث $\vec{\alpha}\vec{GA} + \vec{\beta}\vec{GB} = \vec{0}$

مراهنة و تعريف

لتكن $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ نقطتين متزنتين من المستوى حيث $\alpha + \beta \neq 0$.

توجد نقطة وحيدة G من المستوى حيث $\vec{\alpha}\vec{GA} + \vec{\beta}\vec{GB} = \vec{0}$

النقطة G تسمى مرجح النقطتين المتزنتين $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$.

ملاحظة

إذا كان $\alpha + \beta = 0$ فان النقطتين المتزنتين $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ لا تقبلان مرجحاً.

3- مركز ثقل نقطتين تعريف

مركز ثقل نقطتين A و B هو مرجح A و B المعينين بنفس المعامل الغير المنعدم.

خاصة

مركز ثقل نقطتين A و B هو منتصف $[AB]$

4- الصمود

ليكن $k \in \mathbb{R}^*$

$\alpha + \beta \neq 0 \quad \vec{GA} \text{ و } \vec{GB} = \vec{\beta} \Leftrightarrow (B; \beta)$ و $(A; \alpha)$ مرجح النقطتين المتزنتين

$k\alpha + k\beta \neq 0 \quad k \quad \vec{GA} + k\alpha \vec{GB} = \vec{0} \Leftrightarrow \beta$

مرجح النقطتين المتزنتين $(A; k\alpha)$ و $(B; k\beta)$ $\Leftrightarrow G$

خاصة

مرجح نقطتين لا يتغير إذا ضربنا وزنيهما في نفس العدد الغير المنعدم.

تمرين

حدد α و β حيث G مرجح $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ في الحالتين

$$\text{أ- } 2\vec{GA} - 3\vec{GB} = 5\vec{AB}$$

$$\text{ب- } A \text{ مركز ثقل } G \text{ و } B.$$

5- الخاصية المميزة

نشاط

ليكن α و β عددين حقيقيين حيث $\alpha + \beta \neq 0$ -1 بين أن G مرجح $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ تكافئ-2 نسب المستوى (P) إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \overrightarrow{OA} + \frac{\beta}{\alpha + \beta} \overrightarrow{OB}$$

ب/ استنتج إحداثي G علماً أن $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$ ج/ حدد إحداثي G' مرجح $(A; -2)$ و $(B; 2)$ حيث $(A; 1)$ و $(B; 4)$ **مبرهنة** α و β عددان حقيقيان حيث $\alpha + \beta \neq 0$ تكون G مرجح $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ إذا و فقط إذا كان لكل M من المستوى

$$\overrightarrow{\alpha MA} + \overrightarrow{\beta MB} = (\quad + \quad) \overrightarrow{MG} \quad \alpha$$

نسخة α و β عددان حقيقيان حيث $\alpha + \beta \neq 0$ تكون G مرجح $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ إذا و فقط إذا كان

$$\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{(\alpha + \beta)} \overrightarrow{AB} \quad \text{إذا و فقط إذا كان}$$

$$\overrightarrow{BG} = \frac{\alpha}{(\alpha + \beta)} \overrightarrow{BA} \quad \text{إذا و فقط إذا كان}$$

ملاحظةمرجح نقطتين مختلفتين A و B تنتهي إلى المستقيم (AB) **6- احداثياً مرجح نقطتين**في مستوى منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}; \vec{j})$. لتكن $G(x_G; y_G)$.

$$\begin{cases} x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B}{\alpha + \beta} \\ y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B}{\alpha + \beta} \end{cases} \quad \text{إذا كان } G \text{ مرجح } (A; \alpha) \text{ و } (B; \beta) \text{ فان}$$

تمرينأنشئ G مرجح $(A; -2)$ و $(B; 3)$ ثم أنشئ G' مرجح $(A; 2)$ و $(B; 1)$ أحسب $\overrightarrow{GG'}$ بدلالة \overrightarrow{AB} **تمرين**أنشئ I مرجح $(A; 2)$ و $(C; 1)$ ثم J مرجح $(A; 1)$ و $(B; 2)$ و K مرجح $(C; 1)$ و $(B; -4)$ -1 أثبت أن B مرجح $(C; 1)$ و $(K; 3)$ -2 بين أن J منتصف $[KI]$.**تمرين**لتكن $A \neq B$ -1 حدد مجموعة النقط M حيث $\|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\| = 0$ -2 حدد مجموعة النقط M حيث $\|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\| = \|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\|$ تمرين حدد إحداثي G مرجح $(A; -2)$ و $(B; 6)$ حيث $A(-4; 3)$ و $B(-1; 2)$ **II- مرجح ثلاث نقاط****1- أنشطة**

نشاط

لتكن A و B و C ثلث نقط من المستوى

$$\vec{GA} + 2\vec{GB} - 5\vec{GC} = \vec{0} \text{ حيث } G$$

$$\vec{GA} - 2\vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0} \text{ حيث } G$$

لتكن A و B و C نقط مختلفة و α و β و λ أعداد حقيقية

$$(*) \quad \alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} + \lambda\vec{GC} = \vec{0} \text{ حيث } G$$

الجواب

$$(\alpha + \beta + \lambda)\vec{GA} = \vec{AB} + \beta\vec{AC}$$

$$\vec{AG} = \frac{\beta}{(\alpha + \beta + \lambda)}\vec{AB} + \frac{\lambda}{(\alpha + \beta + \lambda)}\vec{AC} \text{ فان } \alpha + \beta + \lambda \neq 0$$

$$\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} + \lambda\vec{GC} = \vec{0} \text{ حيث } G$$

$$\beta\vec{AB} + \lambda\vec{AC} = \vec{0} \text{ فان } \alpha + \beta + \lambda = 0$$

$$\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} + \lambda\vec{GC} = \vec{0} \text{ حيث } G$$

$$\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} + \lambda\vec{GC} = \vec{0} \text{ فان جميع نقط المستوى تتحقق } \vec{0}$$

2- مبرهنة وتعريف

لتكن $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$ نقط متزنة من المستوى حيث

$$\alpha\vec{GA} + \beta\vec{GB} + \lambda\vec{GC} = \vec{0} \text{ من المستوى } G \text{ حيث } \lambda$$

النقطة G تسمى مرجح $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$

ملاحظة

إذا كان $\alpha + \beta + \lambda = 0$ فان النقطة المتزنة $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$ لا تقبل مرجحا

3- مركز ثقل ثلاث نقط

تعريف

مركز ثقل ثلاث نقط A و B و C هو مرجح A و B و C بنفس المعامل الغير المنعدم.

خاصية

مركز ثقل ثلاث نقط A و B و C هو مرجح $(A; 1)$ و $(B; 1)$ و $(C; 1)$

خاصية

متواسطات مثلث ABC تتلاقى في نقطة وحيدة G هي مركز ثقل المثلث ABC و تحقق $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$

إذا كان ' A و ' B و ' C منتصفات $[AB]$ و $[AC]$ و $[BC]$ على التوالي فان $\vec{GA} = \frac{2}{3}\vec{AA'}$ و

$$\vec{CG} = \frac{2}{3}\vec{CC'} \text{ و } \vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BB'}$$

4- خاصية

مرجح ثلاث نقط لا يتغير إذا ضربنا وزنيهما في نفس العدد الغير المنعدم.

5- الخاصية الممندة

نشاط

α و β و λ أعداد حقيقية حيث $\alpha + \beta + \lambda \neq 0$

- بين أن G مرجح $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$ تكافئ $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$

- نسب المستوى (P) إلى معلم $(O; i; j)$

$$\vec{OG} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta + \lambda}\vec{OA} + \frac{\beta}{\alpha + \beta + \lambda}\vec{OB} + \frac{\lambda}{\alpha + \beta + \lambda}\vec{OC} \quad / \text{ بين أن } \alpha, \beta, \lambda$$

ب/ استنتج إحداثياتي G علماً أن $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$

مبرهنة

α و β و λ أعداد حقيقة حيث $\alpha + \beta + \lambda \neq 0$
تكون G مرجح $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ إذا فقط إذا كان لكل M من المستوى

$$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \lambda \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \lambda) \overrightarrow{MG}$$

6- احداثنا مرحج ثلاث نقط

في مستوى منسوب إلى معلم $(O; i; j)$. لتكن $C(x_C; y_C)$ و $B(x_B; y_B)$ و $A(x_A; y_A)$.

$$\begin{cases} x_G = \frac{\alpha x_A + \beta x_B + \lambda x_C}{\alpha + \beta + \lambda} \\ y_G = \frac{\alpha y_A + \beta y_B + \lambda y_C}{\alpha + \beta + \lambda} \end{cases}$$

إذا كان G مرجح $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$ فان

$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \lambda \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \lambda) \overrightarrow{MG}$ وهذه $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$ مرجح G
* لو كان $\alpha + \beta \neq 0$ فإن $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ تقبل مرجح G_1 ومنه $\alpha \overrightarrow{MA}_1 + \beta \overrightarrow{MB}_1 + \lambda \overrightarrow{MC}_1 = (\alpha + \beta + \lambda) \overrightarrow{MG_1}$
و بالتالي $(\alpha + \beta) \overrightarrow{MG_1} + \lambda \overrightarrow{MC} = ((\alpha + \beta) + \lambda) \overrightarrow{MG}$
إذن G مرجح $(G_1; \alpha + \beta)$ و $(C; \lambda)$

* بنفس الطريقة نبين أن G مرجح $(G_2; \alpha + \lambda)$ و $(B; \beta)$ حيث G_2 مرجح $(A; \alpha)$ و $(C; \lambda)$

* بنفس الطريقة نبين أن G مرجح $(G_3; \beta + \lambda)$ و $(A; \alpha)$ حيث G_3 مرجح $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$

خاصية

مرحج ثلاث نقط لا يتغير إذا عوضنا نقطتين بمرجحهما معينا بمجموع معامليهما الغير المنعدم

تمرين

أنشئ G مرجح $(A; 1)$ و $(B; 1)$ و $(C; 2)$

أنشئ $'G$ مرجح $(A; -3)$ و $(B; 2)$ و $(C; -1)$

تمرين

$\overrightarrow{AD} = \frac{4}{5} \overrightarrow{AB}$ مثلث و G مرجح $(A; 1)$ و $(B; 4)$ و $(C; -2)$ نقطة حيث D نقطة حيث $(A; 1)$ و $(B; 4)$ و $(C; -2)$

أنشئ الشكل بين أن D و C و G مستقيمية

تمرين

مثلث ABC . حدد مجموعة النقط M حيث $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = -2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$

III- مرحج أربع نقط
1- مبرهنة وتعريف

لتكن $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$ و $(D; \mu)$ نقط متزنة من المستوى حيث $\alpha + \beta + \lambda + \mu \neq 0$

توجد نقطة وحيدة G من المستوى حيث $\alpha \overrightarrow{GA} + \beta \overrightarrow{GB} + \lambda \overrightarrow{GC} + \mu \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ حيث $(D; \mu)$ و $(C; \lambda)$ و $(B; \beta)$ و $(A; \alpha)$ مرجح G

ملاحظة

إذا كان $\alpha + \beta + \lambda + \mu = 0$ فإن النقطة المتزنة $(A; \alpha)$ و $(B; \beta)$ و $(C; \lambda)$ و $(D; \mu)$ لا تقبل مرجحا

2- مركز ثقل أربع نقط
تعريف

مركز ثقل أربع نقط A و B و C و D هو مرحج A و B و C و D المعينين بنفس المعامل الغير المنعدم.

خاصة

مركز ثقل أربع نقاط A و B و C و D هو مرجح $(A;1)$ و $(B;1)$ و $(C;1)$ و $(D;1)$

3- خاصة

مرجح أربع نقاط لا يتغير إذا ضربنا وزنيهما في نفس العدد الغير المنعدم.

4- الخاصية المميزة**مبرهنة**

و α و β و λ و μ أعداد حقيقية حيث $\mu \neq 0$
تكون G مرجح $(A;\alpha)$ و $(B;\beta)$ و $(C;\lambda)$ و $(D;\mu)$ إذا و فقط إذا كان لكل M من المستوى

$$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \lambda \overrightarrow{MC} + \mu \overrightarrow{MD} = (\alpha + \beta + \lambda + \mu) \overrightarrow{MG}$$

5- الخاصية التجمسية**خاصية**

مرجح أربع نقاط لا يتغير إذا عوضنا نقطتين بمرجحهما معينا بمجموع معامليهما الغير المنعدم أو عوضنا
ثلاث نقاط بمرجحها معينا بمجموع معاملاتها.

تمرين

أنشئ G مرجح $(A;1)$ و $(B;1)$ و $(C;2)$ و $(D;1)$ متوازي الأضلاع $ABCD$
 بين أن $G \in (AC)$